



NOMBRE DE ALUMNO: José Antonio
Jiménez López

NOMBRE DEL PROFESOR: BEATRIZ
GORDILLO

NOMBRE DEL TRABAJO: SUPER NOTA

MATERIA: ENFERMERIA EN EL
CUIDADO DE LA MUJER

GRADO: 4 TO CUATRIMESTRE


GRUPO: A

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 14 DE
NOVIEMBRE DE 2022

Cambios físicos de la mujer en la adolescencia Y principales patologías propias de la mujer durante la adolescencia

INTRODUCCION

El desarrollo del vello pubiano y crecimiento de las mamas son los hechos más destacados de los cambios en la morfología corporal de los adolescentes



ORIGEN


La edad de la menarquia tiende a descender en todos los países cuando las condiciones socioeconómicas son buenas. Influyen escasamente el clima y la raza.

Tabla II. Desarrollo psicosocial (12 a 14 años)

- Dependencia-independencia**
 - Mayor recelo y menor interés por los padres
 - Vacío emocional, humor variable
- Preocupación por el aspecto corporal**
 - Inseguridad respecto a la apariencia y atractivo
 - Interés creciente sobre la sexualidad
- Integración en el grupo de amigos**
 - Amistad. Relaciones fuertemente emocionales
 - Inicia contacto con el sexo opuesto
- Desarrollo de la identidad**
 - Razonamiento abstracto. Objetivos vocacionales irreales
 - Necesidad de mayor intimidad. Dificultad en el control de impulsos. Pruebas de autoridad

CAMBIOS

Cambios a nivel de ovario y tamaño del útero. El crecimiento implica una correlación entre la actividad endocrinológica y el sistema óseo. La GH, tiroxina, insulina y corticoides influyen en el aumento de la talla y la velocidad de crecimiento.




Durante la pubertad, a menudo se producen irregularidades menstruales; estas pueden ser períodos irregulares, infrecuentes o totalmente faltantes, o períodos con sangrado más abundante de lo normal. La maduración ósea parece depender de las hormonas.




Principales patologías

La clamidia es una enfermedad bacteriana de transmisión sexual que se transmite más comúnmente a través de cualquier forma de contacto sexual. Una infección por clamidia puede tratarse fácilmente si se detecta. Crecimiento excesivo del vello Cuando el vello corporal de las mujeres crece más de lo normal o en áreas en las que el vello generalmente se produce en hombres, como en la espalda, el pecho o la cara, la afección se conoce como hirsutismo.



La amenorrea se define como una niña que no tiene un período menstrual durante tres ciclos mensuales o más.

Causas amenorrea primaria	Causas amenorrea secundaria
 <p>Trastornos genéticos</p>	 Embarazo  Lactancia
	 Alteraciones del sueño  Sequedad vaginal  Caída del cabello  Anovulación

 <p>Dieta sana y equilibrada</p>	 <p>Moderar el ejercicio físico</p>	 <p>Medicación o tratamiento médico</p>
---	--	--

El VIH es un virus que puede destruir el sistema inmunitario del cuerpo. Con el tiempo y sin tratamiento, el virus puede causar sida, una enfermedad que amenaza la vida y que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy comprometido. Vulvitis La vulva se refiere a los pliegues suaves de la piel en la parte externa de la vagina. Cuando estos se inflaman o irritan, esto se conoce como vulvitis.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL VIH?

1	2	3
VIH AGUDO	VIH CRÓNICO	SIDA
síntomas similares a los de la gripe que ocurren días o semanas después de contraer el VIH	también se conoce como la etapa latente o asintomática; puede durar varios años	ocurre cuando el recuento de células CD4 cae por debajo de 200 células/mm ³ ; hace que una persona sea vulnerable a infecciones oportunistas y afecciones propias del SIDA

healthline

