

Nombre del Alumno: Wendy Hernández alegría

Nombre del tema: clasificación de úlceras por presión

Parcial: 1

Nombre de la Materia: enfermería clínica

Nombre del profesor: Cecilia de la cruz Sánchez

Nombre de la licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 4er



Xochimilco nuevo municipio de ostuacan Chiapas

17 de septiembre del 2022

Clasificación de úlceras por presión

Según el tejido cutáneo que comprometan.

ERITEMA BLANQUEABLE.

Cuando la úlcera tiene la piel blanquecina alrededor de un círculo rojizo, esta puede aliviarse por medio de compresas.

EPIDERMIS-DERMIS.

Es cuando la úlcera afecta tanto la dermis como la epidermis esta se tornar un poco más dolorosa y empezar a supurar.

HIPODERMIS: TCS.

La úlcera que se origina en el tejido adiposo, es decir, que compromete la parte grasa de la piel, y es la capa más subcutánea de la epidermis.

TEJIDOS PROFUNDOS.

esta úlcera ya compromete tejidos mucho más internos, incluso colocan en exposición músculos.



Según el tipo de grado.

ULCERA POR PRESIÓN GRADO 1: Es la cual se identifica como un eritema que no blanquea a la presión o también como un moretón que se desaparece al momento de ser retirado el agente.

ULCERA POR PRESIÓN GRADO 2: esta úlcera se caracteriza por dañar la dermis y la epidermis así viéndose como una ampolla que al tocarla soltara sangre.

ULCERA POR PRESIÓN GRADO 3: donde se ve lo más interno de la piel a la vez sale un líquido seroso que se da cuando esta infectado y su cuidado con antibióticos y limpieza.

ULCERA POR PRESIÓN GRADO 4: son aquellas más graves no solo dañan la piel sino ya el musculo, hueso, viseras y demás estructuras que sean aprecian y segregan gran cantidad de sangre.