



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno: Andri Guadalupe Pérez Aguilar

Nombre del tema: Causas de Muerte Materna

Parcial: 1°

Nombre de la Materia: Enfermería En El Cuidado De La Mujer

Nombre del profesor: Alfonso Velázquez Ramírez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4°

Causas de Muerte Materna



Es la muerte de una mujer mientras está embarazada 6 semanas, pero a veces se puede extender durante más tiempo, siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y localización del embarazo, debido a cualquier causa relacionada o agravada por el mismo embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. El que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso al control de natalidad como de atención a la salud.



Complicaciones

Las principales complicaciones causantes del 75% de las muertes maternas, son 4: las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto); las infecciones (generalmente tras el parto); la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), los partos peligrosos y complicaciones en el parto (estas están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección por VIH en el embarazo o causadas por las mismas).



Factores de Riesgo

Afecciones de salud existentes o previas al embarazo como enfermedades cardiovasculares, obesidad, asma o un sistema inmune comprometido. Desprendimiento prematuro de placenta, Edad materna más avanzada. Factores de estilo de vida, como ser o haber sido una fumadora de cigarrillos activa. Tener gemelos, trillizos u otros embarazos múltiples.

Causas de la mortalidad materna

- Hemorragias
- Problemas de hipertensión arterial
- Eclampsia y preeclampsia
- Negligencia médica
- las infecciones (generalmente tras el parto);
- los abortos peligrosos.



Reducción de la mortalidad moderna

PREECLAMPSIA

Es la primera causa de complicación en la gestación, que puede llevar a la muerte tanto a la mamá como al bebé.

- Se presenta cuando una mujer embarazada tiene hipertensión arterial y proteína en la orina después de la semana 20 de gestación.



Eclampsia posparto. La eclampsia posparto puede provocar daños permanentes en los órganos vitales, entre ellos el cerebro, los ojos, el hígado y los riñones.

Edema pulmonar. Esta enfermedad pulmonar potencialmente mortal ocurre cuando se presenta un exceso de líquido en los pulmones



INFECCIONES

Tras el parto pueden matar a una mujer sana en dos horas si no recibe la atención adecuada. La inyección de oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia.



HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Después de las 20 semanas de embarazo, la presión arterial superior a 140/90 mm Hg sin ningún otro daño orgánico se considera hipertensión gestacional.

ABORTOS PELIGROSOS

Lo hace alguien que no tiene la capacitación apropiada. se hace con los instrumentos o con las medicinas equivocadas. se hace en condiciones sucias. se hace después de los primeros 3 meses (12 semanas) del embarazo—a menos que se haga en un centro médico u hospital que tenga equipo especial.

HEMORRAGIA GRAVE

Tras el parto pueden matar a una mujer sana en dos horas si no recibe la atención adecuada. La inyección de oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia.



Bibliografía

Mortalidad materna (who.int)

<https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/maternal-morbidity-mortality/informacion/factores#:~:text=Algunos%20factores%20que%20aumentan%20el%20riesgo%20d>

Causas de la mortalidad materna - Martha Debayle

Mortalidad materna - Wikipedia, la enciclopedia libre

<https://www.bing.com/search?q=causasde++muerte+materna&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=causasde+muerte+materna&sc=10-23&sk=&c>

<https://www.bing.com/search?q=causasde++muerte+materna&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=causasde+muerte+materna&sc=10-23&sk=&c>