



**Mi Universidad**

**Súper nota**

*Nombre del Alumno: LEONARDO DANIEL CALZADA CARDENAS*

*Nombre del tema: Causas de muerte materna*

*Parcial: 4ª parcial*

*Nombre de la Materia: Enfermería en el Cuidado de la mujer*

*Nombre del profesor: LIC. ALFONZO VELAZQUEZ RAMIREZ*

*Nombre de la Licenciatura: Lic. enfermería*

*Cuatrimestre 4ª*

# DATO CURIOSO

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 murieron 830 mujeres al día por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, es decir, un total de casi 303.000 mujeres. Esta cifra dista mucho de las 532.000 muertes maternas que se registraron en 1990, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Especialmente, en los países en desarrollo.



# FACTORES DE RIESGO

1º Afecciones de salud existentes o previas al embarazo como enfermedades cardiovasculares, obesidad, asma o un sistema inmune comprometido.

2º Edad materna más avanzada.

3º Factores de estilo de vida, como ser o haber sido una fumadora de cigarrillos activa.

4º Tener gemelos, trillizos u otros embarazos múltiples.



© CanStock Photo.com

# CAUSAS DE MUERTE MATERNA



## CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA



Fuente: Informe sobre la salud en el mundo 2005 - OMS

## CAUSAS PRINCIPALES

### 1. Hemorragias intensas

Hay varias causas que pueden provocar hemorragias intensas durante el parto: un desgarro uterino, la ruptura de un embarazo ectópico (cuando el óvulo se implanta fuera del útero) y problemas derivados de la placenta. Esto puede suponer la muerte en menos de dos horas.

### 2. Infecciones

Dar a luz en condiciones poco higiénicas puede provocar que la madre padezca una infección gravísima que desemboque en una septicemia, una infección que se expande por todo el cuerpo a través de la sangre.

### 3. Eclampsia y preeclampsia

La eclampsia es una enfermedad que aparece a partir de la segunda mitad del embarazo, durante el parto o incluso en el puerperio. Provoca hipertensión, convulsiones o derrames cerebrales y es una de las causas de **mortalidad materna más graves**. En su fase más precoz se conoce como preeclampsia y esta puede diagnosticarse a través de la hipertensión y del nivel de proteínas en la orina.

### 4. Parto obstruido

En ocasiones, la pelvis materna puede impedir la salida del feto. Esto sucede cuando el bebé es demasiado grande en relación con el tamaño de las caderas de la madre, cuando nacen gemelos, cuando la madre mide menos de 150 cm... En estos casos, tanto el bebé como la madre tienen un elevado riesgo de fallecer si no se toman medidas apropiadas.



## PREVENCIÓN PARA REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA

1º Porque viven en zonas remotas y carecen de medios de transporte para trasladarse a un centro sanitario.

2º Debido a creencias culturales o al estatus social de la mujer.

3º Por deficiencias en el propio sistema sanitario, cuya calidad es altamente deficiente.

4º Por falta de información sobre medidas anticonceptivas y demás datos sanitarios

4º Por causas ajenas a la persona, como la pobreza estructural o los conflictos.



# BIBLIOGRAFIAS

<https://ayudaenaccion.org/>

<https://espanol.nichd.nih.gov/>

[www.who.int/maternal\\_child\\_adolescent/](http://www.who.int/maternal_child_adolescent/)

<https://noticiassin.com/>

<https://centrodebioetica.org/>