



Nombre: Lizbeth Jiménez Álvarez

Nombre del tema: Patologías Propias de la Infancia

Nombre de la materia: Enfermería en el cuidado del niño y adolescente

Nombre del profesor: Lic. Sandra Jasmín Ruiz Flores

Nombre de la licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7°

PATOLOGIAS PROPIAS DE LA INFANCIA

PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

La parálisis cerebral infantil (PCI) es un grupo de trastornos que afectan la capacidad de una persona para moverse y mantener el equilibrio y la postura. Es la discapacidad motora más frecuente en la niñez..

TIPOS DE PARALISIS

Los médicos clasifican la parálisis cerebral infantil según el tipo principal de trastorno del movimiento involucrado. Según las áreas del cerebro afectadas, pueden producirse uno o más de los siguientes trastornos del movimiento:

- Rigidez muscular (espasticidad)
- Movimientos involuntarios (discinesia)
- Falta de equilibrio y de coordinación (ataxia)



VARICELA

La varicela es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la varicela-zóster (VVZ). Produce un sarpullido con ampollas, picazón, cansancio y fiebre. La varicela puede ser grave, especialmente en los bebés, los adolescentes, los adultos y las personas con el sistema inmunitario debilitado.

SIGNOS Y SINTOMAS

El síntoma clásico de la varicela es un sarpullido que se convierte en ampollas llenas de líquido que pican, que al final se vuelven costras. El sarpullido puede aparecer primero en la cara, el pecho y la espalda, y extenderse después al resto del cuerpo, incluido el interior de la boca, los párpados y el área genital. a.



SINDROME DE DOWN

El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños "paquetes" de genes en el organismo. Determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer.

TIPOS DE SINDROME

Hay tres tipos de síndrome de Down. Por lo general no se puede distinguir entre un tipo y el otro sin observar los cromosomas porque las características físicas y los comportamientos son similares: trisomía 21, por translocación y con mosaicismo.




INFECCION DE OIDO

La infección del oído medio (otitis media aguda) es una infección en el oído medio. Otra afección que afecta el oído medio se llama otitis media exudativa. Esta afección ocurre cuando se acumula líquido en el oído medio sin causar una infección. La otitis media exudativa no causa fiebre, dolor de oído ni acumulación de pus en el oído medio. Los niños tienen más probabilidades que los adultos de contraer infecciones de oído.

SINTOMAS

Los síntomas comunes de la infección del oído medio en los niños pueden incluir:

- Dolor de oído
- Fiebre
- Nerviosismo o irritabilidad
- Frotarse o jalarse una oreja
- Dificultad para dormir



TRASTORNO DEL ESPECTRO ALCOHOLICO FETAL

Los trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF) son un grupo de afecciones que pueden presentarse en una persona cuya madre bebió alcohol durante el embarazo. Estos efectos pueden incluir problemas físicos y problemas del comportamiento y del aprendizaje. Comúnmente, una persona con un TEAF tiene una combinación de estos problemas.

SIGNOS Y SINTOMAS

Estas afecciones pueden perjudicar a cada persona de diferente manera y pueden ser desde leves hasta graves. Una persona con un TEAF puede tener: Bajo peso corporal, Mala coordinación, Conducta hiperactiva, Dificultad para prestar atención, Mala memoria, Discapacidades del aprendizaje, Retrasos en el habla y el lenguaje, Discapacidad intelectual o coeficiente intelectual bajo, Capacidad de razonamiento y juicio deficientes, Problemas de succión y dificultades para dormir en los bebés, Problemas de audición y de visión, Problemas del corazón, los riñones o los huesos, Estatura más baja de la estatura promedio, Cabeza de tamaño pequeño.



TOSFERINA

Es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos. La tosferina es especialmente peligrosa para los niños pequeños.

SINTOMAS

Los síntomas de la tosferina por lo general aparecen entre 5 y 10 días después de haber estado en contacto con las bacterias que causan la enfermedad. Los primeros síntomas pueden durar de 1 a 2 semanas y suelen incluir:

- Moqueo o congestión nasal
- Fiebre baja (menos de 100.4 °F)
- Tos leve ocasional (puede no suceder con los bebés)
- Apnea (pausas en la respiración que pueden ser mortales) y ponerse azul o morado en el caso de bebés y niños pequeños



CONJUTIVITIS

La conjuntivitis bacteriana causa ojos rojos, picazón y con frecuencia dolor en los ojos. Puede afectar uno o ambos ojos, y con frecuencia se presenta una secreción amarillenta y una hinchazón leve. Este tipo de conjuntivitis requiere a veces de gotas para los ojos con antibiótico recetadas por un pediatra.

SINTOMAS

Los síntomas de la conjuntivitis pueden incluir

- Enrojecimiento de la parte blanca del ojo
- Inflamación de la conjuntiva (la capa fina que cubre la parte blanca del ojo y el interior del párpado) o de los párpados
- Tener más cantidad de lágrimas
- Sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o ganas de restregarse el ojo.
- Picazón, irritación o ardor
- Secreciones (pus o mucosidad)



ROTAVIRUS

El rotavirus es un virus muy contagioso que causa diarrea. Antes de que se creara una vacuna, la mayoría de los niños sufría al menos una infección por rotavirus antes de cumplir 5 años.

SINTOMAS

La infección por rotavirus, en general, se inicia en el plazo de los dos días posteriores a la exposición al virus. Los síntomas iniciales son fiebre y vómitos, seguidos por tres a siete días de diarrea acuosa. La infección también puede causar dolor abdominal.



DERMATITIS ATOPICA

La dermatitis atópica es la enfermedad inflamatoria más frecuente de la piel y afecta a uno de cada cinco niños y niñas. Consiste en la aparición de lesiones eczematosas cutáneas asociadas a intenso picor. La dermatitis atópica es crónica y no contagiosa

SINTOMAS

- El síntoma principal es el picor, intenso y persistente.
- El signo principal es la dermatitis seca y recurrente.
- Se puede asociar rinitis, con o sin asma, en más de la mitad de los niños.



INFECCIONES URINARIAS

Las infecciones en la vejiga son muy comunes en niños y adolescentes. Éstas se producen cuando se amontonan bacterias en las vías urinarias.

SINTOMAS

Los principales síntomas son el dolor al orinar, mojar la cama, dolor abdominal, dolor en el costado y el hecho de orinar con mucha frecuencia.



BRONQUIOLITIS

Es una enfermedad muy frecuente en niños y bebés en la época de gripes. Se produce por un virus. Para la bronquiolitis el médico no suele prescribir antibiótico. La mejor manera de tratar una bronquiolitis es hidratarse a menudo.

SINTOMAS

Algunos síntomas son:

- Piel morada debido a la falta de oxígeno (cianosis) - se necesita tratamiento urgente.
- Dificultad respiratoria, que incluye sibilancias y falta de aliento.
- Tos.
- Fatiga.
- Fiebre.
- Los músculos alrededor de las costillas se hunden a medida que el niño trata de inhalar (llamado tiraje)

