



**Mi Universidad**

## **Cuadro Sinóptico**

*Nombre del Alumno: Elvia Velasco Castellanos*

*Nombre del tema: Patologías propias de la infancia*

*Parcial: segundo parcial*


*Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado del niño y adolescente.*

*Nombre del profesor: Sandra Yazmin Ruiz Flores*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: séptimo cuatrimestre*

*Pichucalco Chiapas a 30 de noviembre del 2022.*



# Patologías propias de la infancia

## Trastornos hematológicos del recién nacido


Las enfermedades hematológicas más frecuentes son la leucemia, los síndromes mielodisplásicos, el mieloma múltiple, el linfoma o los trastornos mieloproliferativos que se produce al disminuir el número de células de la médula ósea y la reducción de la producción de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, lo que causa anemia aplasia

Para prevenir este tipo de enfermedades es evitar las infecciones oportunistas lavándose las manos regularmente y evitar las aglomeraciones.

## Patología metabólica

son enfermedades genéticas y hereditarias producidas por mutaciones que van a conducir a fenotipos desadaptativos, de los cuales los más conocidos son el retardo mental, la desnutrición, el daño neurológico y la muerte.

# Problemas en el recién nacido



# Patología digestiva, de los más comunes

## Regurgitación

Es devolver sin esfuerzo la fórmula o la leche materna consumidas, por la boca o la nariz.

Empeora cuando él bebe come demasiado rápido o traga aire

Desaparece entre las edades de 7 y 12 meses.

Puede reducirse alimentando al bebe antes de que tenga mucha hambre, haciéndolo eructar cada 4 o 5 minutos, colocándolo en una posición erguida durante y después de la comida.

## Vomito

Es el esfuerzo molesto que se hace para arrojar el alimento consumido.

Puede ser también causado por los trastornos potencialmente mortales

Meningitis

Obstrucción intestinal

Una apendicitis

# Patología digestiva, de los más comunes

## Diarrea

La diarrea aguda comienza repentinamente y mejora en uno o varios días

La diarrea aguda es causada más frecuentemente por la gastroenteritis vírica, que probablemente se acompañe de vomito.

También puede ser causada por una infección bacteriana o por paracitos, por una infección localizada en cualquier otra parte del cuerpo, como el oído o las vías respiratorias y como un efecto secundario del uso de antibióticos.

## Estreñimiento

Es el paso infrecuente de una deposición dura y seca.

Causado por deshidratación, por fibra insuficiente en la dieta o por un cambio en los patrones de la alimentación.

El tratamiento varia con la edad del niño.

A los bebes de 2 meses se les puede dar una cucharadita de jarabe de maíz dietético el el biberón de la mañana y en el de la noche.

El zumo de manzana o de ciruela es beneficioso para los bebes entre 2 y 4 meses de edad.

Los bebes entre 4 meses y 1 año pueden sentir alivio consumiendo cereales con alto contenido de fibra o albaricoque, ciruelas pasas, o ciruelas tamizadas.

Los niños de más de 1 año deben consumir alimentos altos en fibra, como las frutas, los guisantes, los cereales, las habas y las espinacas.

## Referencia

<https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/enfermedades-respiratorias>

<https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicio>

Nuevo Manual Merck de información médica general, pág. 1815-1829

