



**Mi Universidad**

**Super nota**

*Nombre del Alumno: Molina Moreno Jorge Alejandro*

*Nombre del tema: VIH/SIDA*

*Parcial: 4to Parcial*

*Nombre de la Materia: Enf. Clínica*

*Nombre del profesor: María Cecilia*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 4*

# VIH/SIDA

**El VIH es el virus que causa el SIDA. SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las personas que tienen VIH no siempre desarrollan el SIDA. El VIH es un virus que se transmite de persona a persona.**

## ¿Cómo prevenir el VIH?

Existen ahora más herramientas que nunca para prevenir el VIH. Puede usar estrategias, como la abstinencia (no tener relaciones sexuales), no compartir agujas nunca y usar condones de la manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales.



## ¿Cómo prevenir del SIDA?

Llevar a cabo correctamente el tratamiento e indicaciones del medico para evitar la evolución.



## Tratamiento del VIH/SIDA

El tratamiento para el VIH (terapia antirretroviral, TARV o ART) implica tomar medicamentos según las indicaciones de un proveedor de atención médica. Este tratamiento reduce la cantidad de VIH en su cuerpo y ayuda a que se mantenga sano. No hay cura para el VIH, pero puede controlarlo con tratamiento para el VIH.



## DX

El diagnóstico del VIH se realiza mediante un análisis de sangre que identifica alguno de los componentes del virus (principalmente su RNA) o los anticuerpos formados frente a alguno de esos componentes. Estos análisis son sencillos de realizar y permiten establecer con certeza si existe o no infección.



## Mitos del VIH

- Mito 1: El VIH y el SIDA son lo mismo**
- Mito 2: El VIH es una enfermedad exclusiva de la comunidad LGBTIQ+**
- Mito 3: Los pacientes de VIH pueden detectarse por su apariencia física.**

## Epidemiología

Las contracciones comienzan de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé. La mujer puede tener escalofríos o sentirse temblorosa. Por lo general, la placenta tarda menos de 30 minutos en salir de la vagina. El proveedor de atención médica puede pedirle a la mujer que pujé. El proveedor puede jalar suavemente el cordón umbilical y masajear el útero para ayudar a que la placenta se libere. En algunos casos, la mujer puede recibir medicamentos para prevenir el sangrado.







