



Mi Universidad

Supernota

Nombre del Alumno: Adolfo Angel Pascual Gómez

Nombre del tema: Alteración de la respuesta inmunitaria VIH/SIDA

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Enfermería clínica

Nombre del profesor: Zamorano Rodríguez María Cecilia

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: Cuarto

Comitán de Domínguez, Chiapas a 30 de noviembre de 2022

Alteraciones de la respuesta inmunitaria VIH/SIDA.

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, causante de la infección del mismo nombre, las siglas “VIH” pueden referirse al virus y a la infección que causa.

SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es la fase más avanzada de la infección por el VIH.



Para prevenir el riesgo de transmisión por vía sexual se sugiere:

- **Mantener una pareja sexual única;** reduce las probabilidades de transmisión, así como el mantener una comunicación honesta, plena de confianza y asegurando que ambos no se encuentren viviendo con VIH.
- **Usar correctamente el condón masculino de látex y/o el condón femenino de poliuretano;** en todas las relaciones sexuales con penetración o sin ésta, cuando exista la posibilidad de contacto con fluidos corporales.
- **Sexo seguro;** es decir, prácticas sexuales sin penetración, con el fin de que no haya riesgo de contacto entre líquidos infectantes y mucosas de otra persona. Tales
- **prácticas pueden ser:** besos, caricias, abrazos, autoerotismo (masturbación), estimulación mutua, masajes y frotamiento.
- **Sexo protegido;** se refiere al uso correcto de barreras plásticas o de látex y de condones para cualquier tipo de actividad sexual donde exista la posibilidad de contacto entre líquidos infectantes con mucosas.



El virus se transmite por:

- **Vía sexual:** por el contacto sexual con una persona que vive con VIH, ya sea de forma oral, vaginal o anal, cuando hay intercambios con fluidos corporales tales como semen, líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales y menstruales.
- **Vía sanguínea:** a través de la sangre, como puede ser una transfusión o al compartir una misma aguja (como el uso de drogas intravenosas o al realizarse un tatuaje).
- **Vía perinatal o vertical:** la transmite la madre portadora al bebé, en cualquier momento del embarazo, en el parto y con leche infectada al amamantarlo.



Bibliografía (UDS, 2022 periodo (septiembre-diciembre))

UDS. (2022 periodo (septiembre-diciembre)). *Enfermería clínica I*. Comitan de Dominguez.