



Nombre del Alumno: Eldha Madai Vázquez Hernández

Nombre del tema: Súper Nota

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Cuatrimestre: 4 cuatrimestre

Periodos de trabajo de parto vaginal



El trabajo de parto vaginal se compone de tres etapas:

Primera etapa:
periodo de dilatación

Segunda etapa:
periodo de expulsión

Tercera etapa:
periodo de alumbramiento


Un parto dura de 12 a 18 horas de media en la mujer primípara y tiende a cortarse hasta 6 a 8 horas en los embarazos siguientes.

Fase latente: división preparatoria

Fase activa: división de dilatación

Cuello uterino

Primipara



Multipara

Fig. 15-14. Cuello cerca del final del embarazo, pero antes del parto. Ambos, primigravida, etapa, multipara.

La abertura del útero llamada cuello uterino comienza a afirmarse y ensancharse o dilatarse.



Durante el parto vaginal, el cuello del útero debe ablandarse y abrirse completamente la mujer debe empujar hacia el exterior y él bebe realizar.

BIBLIOGRAFIA: Laza Vásquez, C., & Puerto

Lozano, M. I. (2011). Cuidados genéricos para restablecer el equilibrio durante el puerperio. *Revista Cubana De Enfermería*, 27(1), 88-97

Langer M. *Maternidad y sexo*. 3a Ed. Buenos Aires: Paidós, 1974. 4. Ministerio de Salud y Acción Social. “Propuesta Normativa Perinatal” - Tomo I. Atención del embarazo normal, parto de bajo riesgo y atención inmediata del recién nacido. Buenos Aires: M.S. y A.S., 1995