

**Nombre de alumno: FATIMA LIZBETH
PONCE SOBERANO**

**Nombre del profesor: MARIA CECILIA
ZAMORANO RODRIGUEZ**

Nombre del trabajo: SUPER NOTA

**Materia: ENFERMERIA EN EL CUIDADO
DE LA MUJER**

Grado: CUARTO CUATRIMESTRE

Grupo: A

PERIODOS DE TRABAJO DE PARTO VAGINAL

EL PARTO SE COMPONE DE TRES ETAPAS PRINCIPALES

Primera etapa: periodo de dilatación (o trabajo de parto). Cuenta con dos fases, inicial y activa.

Segunda etapa: periodo de expulsión. Se trata del nacimiento del bebé.

Tercera etapa: periodo de alumbramiento. Se trata de la



CUANTO DURA EL PARTO

El parto suele comenzar aproximadamente en torno a 2 semanas antes o después de la fecha estimada del parto. Hacia el final del embarazo (después de 36 semanas), el médico examina el cuello uterino para intentar predecir cuándo comenzará el parto. Un parto dura de 12 a 18 horas de media en la mujer primípara (que da a luz por primera vez) y tiende a acortarse hasta de 6 a 8 horas de media en los embarazos siguientes. Una futura madre puede desear que su pareja esté junto a ella durante el parto.


ETAPAS

Durante el trabajo de parto temprano: La abertura del útero, llamada cuello uterino, comienza a afinarse y ensancharse, o dilatarse.

Durante el trabajo de parto activo: Las contracciones se vuelven más fuertes, más largas y más dolorosas.

Durante la etapa 2: La mujer puede sentir presión en el recto a medida que la cabeza del bebé se mueva a través de la vagina.

Durante la etapa 3: Las contracciones comienzan de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé.



LUGAR DEL PARTO

Aunque algunas mujeres prefieren dar a luz en casa. Sin embargo pueden aparecer complicaciones inesperadas durante el parto o poco después de este, incluso en mujeres que han tenido un buen control prenatal y que no presentan signos de problema alguno.



BIBLIOGRAFÍA

1. Bustamante, F., Urquidia, C., Florenzano R., Barrueto, C., Hoyose, J., Ampuero, K., Terán, L., Figueroa, M., Farías, M., Livia, M. y Giacamanm, E. (2018).
2. El programa RADAR para la prevención del suicidio en adolescentes de la región de Aysén, Chile: resultados preliminares. *Revista Chilena Pediatría*, 89(1), 145-148. Doi: 10.4067/S0370-41062018000100145
3. OMS (2014). Prevención del suicidio: un imperativo global. https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf
4. Martínez, C. (2017). *Suicidología comunitaria para América Latina. Teoría y experiencias*. ALFEPSI
5. UNICEF (2018). *Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas (Communication, Childhood and Adolescence)*. <https://www.unicef.org/argentina/informes/comunicaci%C3%B3n-infancia-y-adolescencia-gu%C3%ADa-para-periodistas>
6. Asociación Argentina de Perinatología. *Primera guía argentina de Perinatología. Organización de un centro perinatólogo*. Buenos Aires: 1995.