



Catedratico

Maria Del Carmen Lopez Silba

Alunma

Fany Yareni Hernandez Lopez

Tema

Medicion en UCI

Septimo A

Materia

Practicas clinicas de Enfermeria

Licensiatura en enfermeria

PASIÓN POR EDUCAR

Comitan De Dominguez Chiapas 12/11/22

MEDICACIÓN EN U.C.I

ANTITROMBÓTICOS Y ANTI-ISQUÉMICOS ASPIRINA Salvo contraindicación absoluta se administrarán 300 mg de AAS vía oral al ingreso, cuanto antes mejor, seguidos de 100 mg/ 24 horas.



Contraindicaciones para AAS

Alergia documentada

Antecedentes de HDA inducida por AINEs

Úlcera péptica



ENOXAPARINA Es heparina de bajo peso molecular, se administrará 1mg/Kg. Cada 12 horas por vía S.C. y se mantendrá hasta el alta hospitalario o la revascularización coronaria si se practica, durante un máximo de 7 días.



TIROFIBAN (Agrastat) Indicado en la prevención del IAM precoz en pacientes con angina inestable o IAM sin onda Q cuyo último episodio de dolor haya sido en las últimas doce horas y que presentan cambios en el ECG y aumento.



ANTAGONISTAS DEL CALCIO

ANTAGONISTAS DE CALCIO

- Fármacos antiarrítmicos, antihipertensores y antianginosos.
- No todos los Calcioantagonistas se usan como antianginosos.
- Dihidropiridinas: **nifedipina, nicardipina, amlodipina**
- Verapamilo
- Diltiazem



PROTOCOLO PARA CATETERISMOS



NUTRICION PARENTERAL

Proporcionar todos los principios nutritivos necesarios para mantener al paciente y promover su recuperación.

