



**Nombre: Osiel palacios
lopez**

**materia: Zootecnia de
pequeñas especies**

grado y grupo : VII

LMVZ A

DE LAS HEMBRAS

Por lo general, la pubertad se presenta primero en las razas de talla pequeña, como Chihuahua, Yorkshire Terrier, Poodle miniatura, Poodle mediano (entre seis y diez meses de edad).

Proestro (duración: 3-20 días)

Comportamiento: la hembra atrae al macho pero no acepta la monta. • Estructuras ováricas: folículos en crecimiento. la vulva se encuentra aumentada de tamaño, enrojecida y se observa secreción serosanguinolenta que fluye a través de los labios vulvares

Estro (duración: 3-20 días)

Comportamiento: receptividad al macho. Estructuras ováricas: folículos de Graaf que ovulan al inicio de esta etapa. Signos clínicos: vulva inflamada, el sangrado continúa al inicio de esta etapa

Diestro (duración: 63 ± 5 días en perras gestantes y 70 a 80 en perras vacías)

Comportamiento: Tranquila, ya no atrae al macho. • Estructuras: Cuerpo lúteo al inicio, posteriormente cuerpo albicans. • Signos: al inicio, la vulva puede seguir inflamada. • No hay flujo serosanguinolento. • No atrae ni acepta al macho.

En esta etapa progestacional o de diestro, puede ocurrir la pseudogestación o piometra por tanto, es importante verificar el estado del útero post-estro por ultrasonido 35 a 40 días después de la última monta o inseminación.