

UDS

universidad del sur

1 profesor:

MVZ María Fernanda




2 alumna:

Nelly Janeth

3 materia:

zootecnia de

pequeñas especies




4 actividad:

super nota

5 grado y grupo: VII

cuatrimestre "A"



6 Comitán de

dominguez chiapas a


09 de noviembre del

2022

CICLO ESTRAL DE LA PERRA

1

el manejo reproductivo de la perra depende exclusivamente de la apreciación visual, de estos signos clínicos, sino que se apoyará de otras técnicas, que se explicarán en este capítulo. También se incluirá información referente al inicio de la pubertad, ya que es importante conocer el momento en que la hembra empezará su actividad reproductiva.



2

Los animales que se crían en forma libre, con acceso a jardín, o que tengan suficiente espacio para jugar, son más precoces para iniciar su vida reproductiva, en comparación con los que se mantienen confinados con espacio limitado.


También debe destacarse que pubertad no significa madurez sexual, ya que esta última ocurre, cuando la tasa ovulatoria alcanza su pico máximo, lo cual puede ocurrir hasta el tercer o cuarto estros.

3

El ciclo estral de la perra se divide en proestro, estro, diestro y anestro.

Proestro (duración: 3-20 días)

- Comportamiento: la hembra atrae al macho pero no acepta la monta.
- Estructuras ováricas: folículos en crecimiento.



4

Estro (duración: 3-20 días)


Comportamiento: receptividad al macho; sin embargo, muchas hembras no lo acepta en ningún momento, presentan intranquilidad, algunas disminuyen su ingesta de alimento. Estructuras ováricas: folículos de Graaf que ovulan al inicio de esta etapa. Signos clínicos: vulva inflamada, el sangrado continúa al inicio de esta etapa.



5

Ovulación

Al iniciarse el proestro, gran número de folículos pequeños y medianos empiezan su desarrollo; algunos degeneran y otros llegan a constituirse en folículos de Graaf, con diámetro de 0.6 a 1.0 cm. La ovulación es espontánea y sucede en los primeros dos días del estro.



6

Diestro (duración: 63 + 5 días en perras gestantes y 70 a 80 en perras vacías)

Comportamiento: Tranquila, ya no atrae al macho.

- Estructuras: Cuerpo lúteo al inicio, posteriormente cuerpo albicans.
- Signos: al inicio, la vulva puede seguir inflamada.
- No hay flujo serosanguinolento.
- No atrae ni acepta al macho.

