



ALUMNA : DANNA ISELA RODRIGUEZ LÓPEZ

PROFESORA: ANA GABRIELA VILLAFUERTE AGUILAR

NATERIA : ZOOTECNIA DE OVINOS Y CAPRINOS

GRADO Y GRUPO : VII LMVZ A

COMITAN DE DOMÍNGUEZ A 13 DE OCTUBRE DEL 2022

CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE LA HEMBRA



CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE LA HEMBRA

NUTRICION

Cuando los animales padezcan una escasez prolongada de comida, pueden verse afectados

- TEMPERATURA Y HUMEDAD
- PRESENCIA DEL MACHO
- PROLIFICIDAD

CONTROL DE LA REPRODUCCION

El intervalo entre partos depende de la duración de la gestación, ciclo estral y anestro postparto. El promedio de intervalo entre los partos es aproximadamente de 8 meses sin diferencia apreciable entre las razas.

INSEMINACION ARTIFICIAL

La detección de calores es imprescindible para determinar el momento de la I.A. salvo en aquellos programas que utilizan sincronización de estro con I.A. a tiempo fijo.

LACTANCIA

Un cordero debe obtener una cantidad adecuada de calostro de la oveja lo más rápidamente posible {no más de 6 h después del nacimiento).
Si el cordero debe ser criado se le puede administrar calostro con mamila cada 4 h.