



Mi Universidad

CUADRO SINOPTICO

Nombre del Alumno: ANDREA LIZETH JIMENEZ GUTIERREZ

Parcial: I

Nombre de la Materia: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA II

Nombre del profesor: SILVESTRE CASTILLO ERVIN

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERÍA

Cuatrimestre: 7° "B"

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS A 10/10/2022



ATENCIÓN INICIAL A PACIENTE QUEMADO EN UCI

DEFINICIÓN

Las quemaduras son lesiones térmicas debido a la acción de agentes físicos, químicos o biológicos los cuales provocan múltiples alteraciones tisulares, que dependiendo de su extensión y gravedad producirán desde lesiones mínimas caracterizadas por un eritema hasta lesiones con destrucción total de diversas estructuras.

MANEJO DEL PACIENTE QUEMADO

La valoración inicial

Debe ser manejada en Servicio de Urgencias, ameritando el cumplimiento del ABCDE de la reanimación inicial, asegurando la permeabilidad de la vía aérea, en particular en los pacientes con quemaduras faciales o por inhalación y deflagración.

La valoración secundaria

Consiste en evaluar la respuesta del paciente a las medidas de reanimación inicial, valorando el estado neurológico.

CRITERIOS SEPSIS EN EL PACIENTE QUEMADO

- Temperatura $< 36.5\text{ }^{\circ}\text{C} > 39\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Taquicardia $> 110\text{ x'}$ ($> 2\text{ DS}$ en niños)
 - Taquipnea $> 25\text{ x'}$ VM $> 12\text{ L/min}$ ($> 2\text{ DS}$ en niños)
 - Trombocitopenia $< 100,000/\text{mm}^3$
- Disminución $> 20\%$ en las primeras 24h
- Hiperglucemia $> 200\text{ mg/dL}$ en ausencia de diabetes Resistencia a insulina ($> 7\text{ UI/h}$ en infusión) Aumento de 25% de requerimientos de insulina en 24h.
 - Imposibilidad de alimentación enteral $> 24\text{h}$ Distensión abdominal, Intolerancia de la alimentación enteral, (doble del volumen infundido por hora en adultos o $> 150\text{ mL/h}$ en niños) Diarrea incontrolable ($> 2,500\text{ mL/día}$ en adultos o $> 400\text{ mL/día}$ en niños).

GRADO I

Superficial Seca, eritematosa, palidece con la compresión, muy dolorosa.

GRADO II-A

Parcial superficial: Eritematosa, brillante, con ampúlas, palidece con la presión, muy dolorosa.

GRADO II-B

Parcial profunda: Eritematosa, brillante, con ampúlas que se rompen fácilmente, no palidece con la presión, duele a la presión.

GRADO III

Profunda: Blanquecina o grisácea, seco y con pérdida de la elasticidad del tejido, no palidece, poco o nulo dolor.

GRADO IV

Total: Involucra tejido muscular, fascia, cápsula articular y hueso, en abdomen y tórax puede llegar a evidenciar órganos internos