

Alumno: LEONARDO LEOLID LÓPEZ PÉREZ


Profesor: Silvestre Castillo Ervin


Actividad: CUADRO SIMOPTICO

Materia: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA II

Grado: 7° Cuatrimestre/LEN

Grupo: “ B ”





Atención inicial del paciente quemado en UCI

SEPSIS EN EL PACIENTE QUEMADO

Los pacientes quemados presentan una respuesta fisiológica alterada, con cambios en la regulación térmica, hídrica, alteraciones de la coagulación, entre otros, por esto, los criterios de respuesta inflamatoria sistémica se ven modificados

Crterios de sepsis en el paciente quemado

Parámetro

Taquicardia > 110 x' (o > 2 DS en niños)

Taquipnea > 25 x' VM > 12 L/min (o > 2 DS en niños)

Trombocitopenia < 100,000/mm3 Disminución > 20% en las primeras 24 h

Hiperglucemia > 200 mg/dL en ausencia de diabetes Resistencia a insulina (> 7 UI/h en infusión) Aumento de 25% de requerimientos de insulina en 24 h

Imposibilidad de alimentación enteral >24 h: Distensión abdominal Intolerancia de la alimentación enteral (doble del volumen infundido por hora en adultos o > 150 mL/h en niños) Diarrea incontrolable (> 2,500 mL/día en adultos o > 400 mL/día en niños)

CRITERIOS DE REFERENCIAG

En la Guía de Práctica Clínica16 para el diagnóstico y tratamiento del paciente "gran quemado" (IMSS-040-08) se publicaron los criterios para referir a un paciente quemado a una unidad de tercer nivel:

- Pacientes pediátricos menores de dos años o adultos mayores de 65 años con quemaduras de grado II-B o III con más de 10% de SCQ.

- Cualquier paciente con quemaduras grado II-B o III en más de 20% SCQ.

- Quemadura grado II-B o III en áreas especiales (cara, manos, pies, genitales, perineo).

- Quemaduras eléctricas.
- Quemaduras químicas.
- Quemaduras de vías aéreas.

