



# Mi Universidad

*Nombre del Alumno: Esther Sthephany Zelaya Cerón*

*Nombre del tema: Ejercicio 2*

*Parcial: I ro*

*Nombre de la Materia: Estadística Diferencial*

*Nombre del profesor: Ing. Carlos De Jesús Barrios Bermúdez*

*Nombre de la Licenciatura: Psicología*

*Cuatrimestre: 4to*



1. En un kinder se está analizando el peso de los alumnos, los cuales se tomó una muestra de 80 niños la cual arrojaron un peso promedio de 15 kg con una desviación estándar de 2 kg otra muestra de 56 niños arrojó que en promedio pesan 16 kg con una desviación estándar de 2.5 kg unos analistas piensan que los niños no pesan tanto como los niños, Trabajo con un alfa de .01.

$$Z(x_1 - x_2) (0) \quad (x_1 - x_2) = \pm \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$\frac{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}{\quad} \quad (15 - 16) = \pm \sqrt{\frac{2^2}{80} + \frac{2.5^2}{56}}$$

$x_1 = 15$   
 $n_1 = 80$   
 $\sigma_1 = 2$   
 $x_2 = 16$   
 $n_2 = 56$   
 $\sigma_2 = 2.5$   
 $\alpha = .01$

$-1 = \pm 0.4020$   
 $Z = -2.48$

2. Los Dueños de una tienda quieren saber quienes gastan más, si los hombres o mujeres para los cuales se tomó una muestra de 50 mujeres los cuales gastan en promedio la cantidad de 2000 con una desviación estándar de 500, se tomó otra muestra de 60 hombres los cuales en promedio gastan 1950 con una desviación estándar de 300. El grupo de mujeres piensan que no pagan tanto como los hombres, trabajenlo con un alfa de 0.2

$x_1 = 2000$   
 $n_1 = 50$   
 $\sigma_1 = 500$   
 $x_2 = 1950$   
 $n_2 = 60$   
 $\sigma_2 = 300$   
 $\alpha = .02$

$$(x_1 - x_2) = \pm \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$(2000 - 1950) = \pm \sqrt{\frac{500^2}{50} + \frac{300^2}{60}}$$

$$(50) \div \sqrt{6500}$$

$$Z = 0.62$$

$0.5$   
 $-0.02$   


---

 $0.48$   
 $+0.5$   


---

 $0.48$



3. Un grupo de personas está analizando quienes consumen más en productos electrónicos, para los cuales los dividieron en 2 grupos, el grupo uno se obtuvo una muestra de 100 personas arrojó que gastó en promedio la cantidad de 5000 con una desviación estándar de 800. Para el grupo dos se tomó una muestra, se analizó que gastan en promedio de la cantidad de 6500 con una desviación estándar de 1000. Los analistas creen que el grupo uno gasta más que el grupo dos. Trabajenlo con un alfa de .01.

$$x_1 = 5000$$

$$n_1 = 100$$

$$s_1 = 800$$

$$x_2 = 6500$$

$$n_2 = 100$$

$$s_2 = 1000$$

$$\alpha = .01$$

$$|x_1 - x_2| = \pm \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

$$5000 - 6500 = \pm \sqrt{\frac{800^2}{100} + \frac{1000^2}{100}}$$

$$z = -1500 \div \sqrt{\frac{800^2}{100} + \frac{1000^2}{100}}$$

$$z = -11.71$$



1. En la cafetería de una primaria se pretende saber si la proporción de niñas es igual a mayor al 62%.

Para confirmar la hipótesis se toma en cuenta una muestra de 65 alumnos al azar con una proporción del 57% de niñas.

Realizar la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 0.01.

$$\hat{p} = .62 \text{ (62\%)} \\ p = .57 \text{ (57\%)} \\ n = 65 \\ \hat{q} = (1 - \hat{p})$$

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}}}$$

$$z = \frac{.62 - .57}{\frac{\sqrt{.62(1-.62)}}{65}}$$

$$z = 1.58 \times 10^{-3} \\ z = 0.0015806$$

2. Se pretende conocer si los hombres son igual o mayor los que más común en un restaurante con un 59%.

Una encuesta realizada a 60 personas arrojó que el 52% son hombres.

Realízelo con un nivel de significancia de .02.

$$\hat{p} = 59\% \text{ (0.59)}$$

$$p = 52\% \text{ (0.52)}$$

$$n = 60$$

$$\hat{q} = (1 - \hat{p})$$

$$z = \frac{0.59 - 0.52}{\frac{\sqrt{0.59(1-.59)}}{60}}$$

$$z = 0.5857$$