

# Medicación en U. C. I

## Aspirina


Salvo contraindicación absoluta se administrarán 300 mg de AAS vía oral al ingreso, cuanto antes mejor, seguidos de 100 mg/ 24 horas.

Contraindicaciones para AAS Alergia documentada Antecedentes de HDA inducida por AINES Úlcera péptico



## ENOXAPARINA

Es heparina de bajo peso molecular, se administrará 1mgr/Kg. Cada 12 horas por vía S.C. y se mantendrá hasta el alta hospitalario o la revascularización coronaria si se practica, durante un máximo de 7 días.



## Heparina sodica no fraccionada para ev

Se administrará como alternativa a la Enoxaparina, administraremos un bolo seguido de perfusión que se mantendrá entre 24 y 48 horas.

En pacientes anticoagulados con dicumarínicos se omitirá el bolo y la perfusión no se iniciará hasta que el INR sea < 2.



## Tirofiban

) Indicado en la prevención del IAM precoz en pacientes con angina inestable o IAM sin onda Q cuyo último episodio de dolor haya sido en las ultimas doce horas y que presentan cambios en el ECG y/o aumento



## Amilodipino

4 mg oral cada 12 horas, siempre asociado a Betabloqueantes o a otro Antagonistas del Calcio, alternando el horario de administración (3 horas mínimo entre ellos).



Si quieres acceder a más recursos para emprendedoras como tú, ingresa a nuestro sitio web:

[www.sitioincreible.com](http://www.sitioincreible.com)