



Mi Universidad

Nombre del Alumno: ESTEBAN CONTRERAS HUERTA

Nombre del tema: SUPER NOTA.

Parcial: 3 PARCIAL

Nombre de la Materia: PRACTICA CLINICA ENFERMERIA II.

Nombre del profesor: MARIA DEL CARMEN LOPEZ.

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA.

Cuatrimestre: 7° CUATRIMESTRE.

Lugar y Fecha de elaboración: 08/11/22

MEDICACION EN LA UCI.

ANTITROMBÓTICOS Y
ANTI-ISQUÉMICOS



ASPIRINA
contraindicación
absoluta se



ENOXAPARINA

Es heparina de bajo peso molecular, se administrará 1mgr/Kg. Cada 12 horas por vía S.C. y se mantendrá hasta el alta hospitalario o la revascularización coronaria si se practica, durante un máximo de 7 días.

HEPARINA SÓDICA NO
FRACCIONADA E.V. Se
administrará como
alternativa a la Enoxaparina,





TIROFIBAN

(Agrastat) Indicado en la prevención del IAM precoz en pacientes con angina inestable o IAM sin onda Q cuyo último episodio de dolor




ANTAGONISTAS DEL CALCIO

4 mg oral cada 12 horas, siempre asociado a Betabloqueantes o a otro Antagonistas del Calcio.



Programada con mas de 24 horas de antelación

- Flumucil oral forte 600 mgrs cada 12 horas el día menos 1 y el día 0.



Bibliografía: antología de práctica clínica de enfermería II actualizada 2022.