

Foto de seguimiento



**Nombre de alumno: filadelfo domingo
Ruíz Hernández**

Nombre del profesor: samanta guillen

Nombre del trabajo: ensayo

Materia: farmacología 2

Grado: 4

Grupo: LMV

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 3 de diciembre de 2021

[Escriba aquí]

Foto de seguimiento

Introducción

Distocia en bovinos

Esto consiste en la dificultad del parto o su imposibilidad por obstrucción, esto puede deberse a causas fetales, maternas o mecánicas. La distocia se produce cuando existen fallas en uno o más de los tres componentes principales del parto: las fuerzas expulsivas, el canal de parto, y/o el tamaño y la estática fetal.

Esta hembra bovina presento distocia debido a que presento fallas en las contracciones uterinas y abdominales, ya que el también que el becerro venia demasiado grande para pasar por el canal de parto.

Caso clínico

Objetivo:

Mi objetivo de todo esto es teniendo ya mi diagnóstico para poder dar seguimiento a un protocolo de tratamientos e indicaciones a seguir para que mi paciente (hembra bovina) pueda recuperarse bien de los dolores y molestias que causan las infecciones provocado por la distocia.

Materiales empleados

Guantes de palpación

Jeringas y agujas

[Escriba aquí]

Foto de seguimiento




De esta manera es como se llegó a encontrar la vaca con la cría muerta dentro de ella, específicamente en el útero.




Y he aquí donde se dio cuenta el dueño de que no podía parir la vaca, rápidamente se dio cuenta que el becerro ya estaba muerto, porque tenía la lengua mordida y a si a fuera

[Escriba aquí]

Foto de seguimiento



Técnica que utilizo en la extracción del becerro dentro de la madre



Se tuvieron que sujetar de las patas delanteras para jalar al becerro hacia abajo

[Escriba aquí]

Foto de seguimiento

Fecha:

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: s/nombre Especie: BOVINO Edad: 5 AÑOS
21/11/2022

Raza: SUIZO CEBO Color: MORO Fin zootécnico: REPRODUCCION

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: FILADELFO BALTAZAR RUIZ GOMEZ Tel: 961-128-6630

Dirección: C SIN NOMBRE

ANTECEDENTES

Habitad: POTRERO Alimentación: PASTO Vacunación: NO o SI

Cartilla de salud: NO o NO Esterilizado: SI o NO Desparasitaciones: SI o NO

SIGNOS VITALES

Temp: _____ FC: _____ FR: _____ Pul: _____ Peso: 400 kg Llenado
capilar _____

Motivo de la consulta

El dueño del bovino nos informó que uno de sus animales no pudo parir la cría (parto distosico) debido a que la vaca está muy estrecha en el canal del parto ya que el becerro venia demasiado grande, y así presentando la muerte del becerro por asfixia dentro del útero de la madre

Tratamiento anterior

Ninguno

[Escriba aquí]

Foto de seguimiento

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Diagnóstico diferencial | Diagnostico definitivo |
|-------------------------|------------------------|

Pruebas sugeridas:

No se necesitó ningún tipo de prueba, ya que rápidamente se observó que fue un parto distócico

Tratamiento:

Expulsina durante 2 días

2 bolos uterinos durante 3 días

Sugerencias extras:

Se recomienda hacer un lavado intrauterino con solución salina con emicina para tener mayor probabilidad de eliminar bacterias que causen infecciones dentro de los cuernos uterinos y el mejoramiento de la vaca

[Escriba aquí]