



Nombre de alumno: Victor Calvo
Vázquez

Nombre del profesor: Guillen Pohlenz
Samantha

Nombre del trabajo: Super Nota

Materia: Zoonosis y salud publica
veterinaria

PASIÓN POR EDUCAR


Grado: 4

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de Octubre de 2022.

Modelo De Enfermedad

Leve Y clark
 La historia natural de la enfermedad es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. El modelo tradicional de la historia natural de la enfermedad y su relación con los niveles de prevención propuestos por Leve y Clark, se delimitan claramente el periodo pre patogénico y patogénico



Periodo Prepatogénico

se establece la interacción entre el agente potencial de la enfermedad, el huésped y los factores ambientales. En esta fase se da la intervención de la triada ecológica. Cadena epidemiológica Es también conocida como cadena de infección,



Es utilizada para entender las relaciones entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible




Período patogénico

Si todas las circunstancias y características del período prepatogénico coinciden en un huésped susceptible y en un momento determinado del tiempo, se rompe el equilibrio de la triada ecológica y el huésped es afectado por la enfermedad. El período patogénico inicia con sutiles cambios celulares y tisulares. En algunas enfermedades infecciosas estos cambios se dan de manera rápida debido a la rápida multiplicación de los microorganismos, a su virulencia y capacidad de producir toxinas




El período patogénico puede subdividirse en dos etapas
 Período Subclínico: Se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos. En las enfermedades transmisibles, la fase inicial del período patogénico que transcurre entre el momento del estímulo



Período Clínico

Es cuando el ser vivo presenta síntomas o signos clínicos. El momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad es conocido como: Horizonte clínico se divide en tres:

- Período prodrómico
- Período clínico
- Período de resolución



Conclusión

Este trabajo pudo ser elaborado y concluido gracias a la ayuda de las siguientes páginas web y de la información recluida de las clases mismas

Abajo dejare las descripciones de las páginas web

https://drive.google.com/drive/folders/12_IQ-Z6VTnV31PdibjFPXK9eFBhrM0WX