



Mi Universidad

SUPER NOTA

**NOMBRE DEL ALUMNO: DAROLYN
SAYURI HIDALGO MÉNDEZ.**

**NOMBRE DEL TEMA: SUPER NOTA
PARCIAL: II.**

**NOMBRE DE LA MATERIA:
ESTIMULACIÓN TEMPRANA.**

**NOMBRE DEL PROFESOR: LIC.
SANDY NAXCHIELY MOLINA
ROMÁN.**

**NOMBRE DE LA LICENCIATURA:
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA.**

CUATRIMESTRE: 4TO.

2.5 Reflejos arcaicos

Los reflejos arcaicos son de dos tipos: los corticalizables y los que mantienen toda la vida en niveles de control subcortical, como los relativos a la respiración y circulación sanguínea.

Reflejo moro

Se sujeta al bebé por los brazos tirando un poco de ellos hacia arriba, levantando ligeramente la cabeza de la camilla.

Se le suelta bruscamente. El bebé abre los brazos y las manos y los vuelve a cerrar, como dando un abrazo, al tiempo que empieza a llorar.

Desde el 5º mes de gestación y desaparece hacia los 2 meses.



Reflejo de presión

Al tocarle en la palma de la mano con un objeto cualquiera, el bebé cierra los dedos, como para cogerlo.

Este reflejo suele desaparecer hacia los 5-6 meses.



Reflejos orales

Consiste en la orientación selectiva de los labios y la cabeza hacia el sitio donde se aplica una suave estimulación peri bucal, con desplazamiento de las comisuras, elevación del labio superior o estiramiento del labio inferior en persecución del objeto.

Se instala la succión voluntaria entre los 5 y 7 meses.



Reflejos arcaicos

Los reflejos arcaicos son de dos tipos: los corticalizables y los que mantienen toda la vida en niveles de control subcortical, como los relativos a la respiración y circulación sanguínea.

Refeljo de marcha

Se sujeta al bebé por las axilas dejando que apoye las plantas de los pies. Al apoyar una de ellas, flexiona la rodilla y levanta el otro pie, como para dar un paso.

r. Se atenúa al comenzar el 3º mes.



BIBLIOGRAFÍA

<file:///C:/Users/daroh/Documents/UDS%20PSICOLOG%C3%8DA/4TO%20CUATRIMESTRE/ESTIMULACI%C3%93N%20TEMPRANA/924fd82cdf7a5baba266fa7984ca7467-LC-LPS404-ESTIMULACI%C3%93N%20TEMPRANA.pdf>