



Nombre de alumno: Fátima del Rocío Salazar Gómez

Nombre del profesor: Dra. Yanet del Rocío Alfonso Maldonado

Nombre del trabajo: Mapa Conceptual “Morbi-mortalidad materna”

Materia: Bioética y Normatividad

Grado: 3°

Grupo: “A”

MORBI-MORTALIDAD MATERNA

Morbilidad

Es toda complicación que ponga en riesgo la vida de la mujer durante la gestación, parto o dentro de los 42 días posteriores al nacimiento, debido a cualquier etiología relacionada o agravada por el embarazo o como consecuencia de su manejo

Según la OMS

Es toda complicación que ponga en riesgo la vida de la mujer durante la gestación, parto o dentro de los 42 días posteriores al nacimiento, debido a cualquier etiología relacionada o agravada por el embarazo o como consecuencia de su manejo

Predictores de la morbilidad materna

- ❖ La edad
- ❖ El antecedente de hemorragia postparto
- ❖ Sepsis
- ❖ Embarazo múltiple
- ❖ Anemia
- ❖ Diabetes e hipertensión
- ❖ Ruptura uterina
- ❖ Coagulación Intravascular Diseminada

Predictores de la morbilidad materna

Problemas cardiovasculares,	sangrado o hemorragia
Diabetes	anemia
Hipertensión Arterial	depresión y ansiedad
Infecciones	
Coágulos de sangre	

Mortalidad

La ocurrida a una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del mismo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

clasificación

Muertes obstétricas directas

aquellas que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de la cadena de eventos que llevó a cualquiera de los arriba mencionados.

Consultas pre-natales

1^a consulta: entre las 6 - 8 semanas;
2^a consulta: entre 10 - 13.6 semanas;
3^a consulta: entre 16 - 18 semanas;
4^a consulta: 22 semanas;
5^a consulta: 28 semanas;
6^a consulta: 32 semanas;
7^a consulta: 36 semanas; y
8^a consulta: entre 38 - 41semanas.

Factores que aumentan el riesgo

- Edad materna más avanzada.
- Factores de estilo de vida, como ser o haber sido una fumadora de cigarrillos activa.
- Tener gemelos, trillizos u otros embarazos múltiples.
- Ciertas complicaciones del embarazo (preeclampsia, diabetes gestacional)
- Antecedentes raciales, étnicos y socioeconómicos.

Muertes obstétricas indirectas

aquellas que derivan de enfermedad previamente existente o enfermedad que apareció durante el embarazo y que no fue debida a causas obstétricas directas, pero que se agravó por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Causas de la muerte materna

- hemorragias graves
- Infecciones
- hipertensión gestacional
- complicaciones en el parto.
- Abortos peligrosos.

Vigilancia epidemiológica

-La notificación inmediata cuya coordinación y rectoría está a cargo de la Dirección General de Epidemiología.
-La Investigación, documentación y análisis de los casos confirmados a cargo del Centro Nacional de - Equidad de Género y Salud Reproductiva, y
-La Búsqueda Intencionada y Reclasificación.