

**Nombre del alumno: Luis Ángel López  
Hernández**

**Nombre del profesor: Felipe Antonio  
Morales Hernández**

**Nombre del trabajo: mapa conceptual**

**Materia: submodulo 1**

**Grado: "5"**

**Grupo: "A"**

# El Embarazo por Trimestres y sus Posibles Complicaciones

## Primer trimestre

el primer trimestre comprende desde la semana 0 hasta la semana 12 de la concepción (o de la semana 3 a la semana 14 después de la última menstruación)

En el desarrollo del embarazo se presentan ciertos cambios como lo señala UNICEF (2014),

De manera análoga, de acuerdo con Cabanyes (2014), en las primeras semanas de gestación, el feto presenta actividad no obstante dicha actividad del feto es irregular y poco definida,

## Segundo trimestre

El segundo trimestre comprende desde la semana 13 hasta la semana 24 de la concepción (o de la semana 15 a la semana 26 después de la última menstruación)

Por su parte UNICEF (2014) señala que en el segundo trimestre el vientre materno aumenta, lo que le permite a el feto

Por otro lado, de acuerdo con Maldonado, Saucedo & Lartigue (2008), en el segundo trimestre, la mujer gestante puede empezar a fantasear y meditar en el bebé

## Tercer trimestre

menstruación) en esta etapa la piel del feto empieza a engrosarse e intenta tomar cosas débilmente, le crecen las uñas de los pies y los pelos del lanugo desaparecen excepto en algunas zonas,

se puede notar un aumento en la presión en la vejiga,

dice que, en este tercer trimestre, el feto se puede acostumbrar a ciertos estímulos e identificar cambios en ellos, asimismo, es sensible a estímulos complejos tales como variaciones en la música,

## Complicaciones en el Embarazo

Las complicaciones en el embarazo son afectaciones y problemas de salud que requieren de un cuidado especial, dichas complicaciones durante el embarazo pueden afectar la salud del bebé, de la madre o en varios casos afectando a ambos (Izbizky, Lage, Mercanzini & Sebastiani, 2017), en consecuencia Fawed, et al.

Las madres de edades menores de 15 años o cuya menarquía ocurrió menos de dos años antes del embarazo, y las madres entre los 35 años o más, tienen mayor riesgo de muerte neonatal,