

CALENDARIO DE VACUNACION EQUINOS

Enfermedad/Vacuna	NEONATOS/POTRILLOS	AÑEROS	CABALLOS DE ALTO RENDIMIENTO	CABALLOS DE PASEO	YEGUAS REPRODUCTORAS
Influenza equina	Vacuna inactiva: Primera dosis a los 6 meses de edad. Segunda dosis a los 7 meses de edad. Tercera dosis a los 8 meses de edad.	Revacunacion cada 6 meses	Revacunacion cada 6 meses	Revacunacion cada 6 meses	Anual con refuerzo 4 a 6 semanas antes del parto
Virus del oeste del Nilo	Primera dosis a los 6 meses de edad. Segunda dosis los 30 idas. Tercera dosis a los 6 meses en zonas endémicas.	Revacunacion anual, dependiendo del riesgo cada 4 o 6 meses.	Revacunacion anual, dependiendo del riesgo cada 4 o 6 meses.	Revacunacion anual, dependiendo del riesgo cada 4 o 6 meses.	Anual con refuerzo 4 a 6 meses antes del parto.
Encefalitis equina venezolana	Primera dosis a los 4 meses. Revacunacion anual.	Revacunacion anual en la primavera.	Revacunacion anual en la primavera.	Revacunacion anual en la primavera.	No se recomienda. En caso de requerirse vacunar 4 a 6 semanas antes del parto.
Rinoneumonitis (HVE-I, HVE-II)	Primera dosis a los 2 o 4 meses, revacunar a los 3 meses y al año.	Revacunacion cada 3 o 4 meses, despues anual.	Revacunacion cada 3 o 4 meses, despues anual.	Revacunacion cada 3 o 4 meses, despues anual.	Vacunar antes de la monta, cada 6 meses (yegua y sementales). En gestantes vacunar a los 5, 7 y meses.
Rabia	Potros de yeguas no vacunadas primera dosis a los 3 o 4 meses. Segunda dosis a los 12 meses de edad. Potros de yeguas vacunadas. Primera dosis a los 6 meses. Segunda dosis a los 7 meses.y tercera dosis a los 12 meses.	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	Vacunar anualmente	No vacunar a hembras gestantes.