

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TABASCO

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

NOMBRE: KEVIN MANUEL DE LA CRUZ
PÉREZ

CUATRIMESTRE: 5


GRUPO: "A"

CÁTEDRA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

CATEDRÁTICO: DRA MARIANA LOPEZ


CORREO ELECTRÓNICO:
KOBY_MANUEL@HOTMAIL.COM

PARTO EUTOCICO



“Parto eutócico” es un concepto de argot médico para definir un parto natural a término, que tiene lugar entre las semanas 37 y 42, sin intervención alguna. Comprende desde la dilatación del cuello uterino, la salida, el expulsivo y el alumbramiento de la placenta.

Una episiotomía es una cirugía menor hecha durante el parto para ensanchar la abertura de la vagina. Un desgarro o laceración perineal a menudo se forma por sí solo durante un parto vaginal. En raras ocasiones, este desgarro también comprometerá el músculo Alrededor del ano o el recto.



Primeros cuidados del recién nacido

Contacto piel con piel. ...

Limpieza de nariz y boca, según el centro. ...

Corte del cordón umbilical. ...

Test de Apgar. ...

Peso y medida del bebé...

Vitamina K inyectada y colirio. ...

Lavado de recién nacido...

La mama está formada principalmente por tejido adiposo (grasa) y la glándula mamaria. Con los ciclos hormonales y el embarazo, el tejido predominante es el glandular, mientras que, tras la menopausia, la glándula se atrofia y el volumen de la mama depende básicamente del tejido adiposo. El tejido adiposo mamario es uno de los que más se afecta con las oscilaciones del peso, siendo de los primeros tejidos que disminuyen de tamaño al adelgazar, y de los primeros que aumentan al incrementar el peso. La glándula está formada por diferentes lobulillos glandulares (entre 15 y 20), de los cuales salen los conductos galactóforos que confluyen en el seno galactóforo. Esta última estructura comunicará el interior de la mama con el exterior a través del pezón, y es por donde se expulsa la leche en la lactancia.



Inducción Y Conducción Del Parto

Inducción del parto

DEFINICIÓN



Es la iniciación de las contracciones uterinas en una mujer embarazada que no está en la fase de trabajo de parto, con el fin de lograr un parto vaginal.

Maduración cervical: es el uso de medios farmacológicos u otros para ablandar, borrar y/o dilatar el cérvix y así aumentar la probabilidad de un parto vaginal, después de inducir el trabajo de parto.



Conducción del parto

Definición: es la intensificación de las contracciones uterinas en una mujer embarazada que ya se encuentra en trabajo de parto.

Es importante que se recomienda intervenir en el curso espontáneo del parto, sólo si se diagnostica una progresión inadecuada del descenso y/o dilatación o si existe sospecha de compromiso de la unidad feto-placentaria.

Se denomina puerperio o cuarentena al periodo que va desde
El momento inmediatamente posterior al parto hasta los 35-40 días
Y que es el tiempo que necesita el organismo de la madre para recuperar
Progresivamente las características que tenía antes de iniciarse el embarazo.

