



SIGNATURA: GINECÓLOGO Y OBSTETRICIA

NOMBRE DE LA ACT: CUADRO SINÓPTICO

NOMBRE DEL ALUMNO: JOSE IGNACIO CHABLÉ ZACARÍAS

NOMBRE DEL PROFESOR: MARIANA LÓPEZ SANDOVAL

GRADO: 5TO

GRUPO: B

AMENORREO PRIMARIA

¿Qué es?

La amenorrea suele ser un signo de otro problema de salud más que una enfermedad en sí misma, y puede ocurrir por muchos motivos. Puede ocurrir como parte natural de la vida, por ejemplo, durante el embarazo o la lactancia.

¿Qué provoca?

Las anomalías cromosómicas o genéticas pueden hacer que los ovarios dejen de funcionar con normalidad.

Los problemas en el hipotálamo o la glándula hipófisis en el cerebro pueden causar un desequilibrio hormonal que puede impedir el comienzo de los períodos.

AMENORREA SECUNDARIA

¿Qué es?

La ausencia de los períodos menstruales mensuales de una mujer se llama amenorrea. La amenorrea secundaria ocurre cuando una mujer que ha tenido ciclos menstruales normales deja de tener sus períodos por 6 meses o más.

Causas

La amenorrea secundaria puede ocurrir debido a cambios naturales en el cuerpo. Por ejemplo, la causa más común de amenorrea secundaria es el embarazo. La lactancia y la menopausia también son causas comunes, pero naturales.

¿es hereditario?

Uno de los principales factores de riesgo para sufrir amenorrea es tener antecedentes familiares, por lo que se recomienda realizar revisiones periódicas en estos casos o si tienes 16 años y no ha tenido nunca la regla

MIOMATOSIS UTERINA

¿Qué es?

La miomatosis uterina es la presencia de miomas o fibromas en el útero, estos son tumores que se clasifican de acuerdo a su localización. Esta enfermedad es una de las causas de infertilidad por factor uterino.

¿Cómo se clasifica?

- Intramurales
- Subserosos
- Pediculados
- Submucosos

También se pueden clasificar por su tamaño:

Pequeños elementos: su diámetro es menor a 2 centímetros.

Medianos elementos: su diámetro ronda entre los 2 a los 6 centímetros.

Signos y síntomas

Los miomas pueden causar sangrado uterino anormal (p. ej., menorragia, menometrorragia). El sangrado submucoso puede ser lo suficientemente grave como para causar anemia.

¿Cómo se diagnostica?

El estudio más confiable para diagnosticar una miomatosis uterina es el ultrasonido. Su precisión es del 95% si se realiza en el abdomen y del 100% si se realiza vía intravaginal.

ENDOMETRIOSIS

¿Qué es?

La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a las mujeres durante su vida reproductiva. Si el endometrio, que se sitúa fuera del útero, desarrolla incorrectamente, puede asentarse en cualquier lugar del abdomen. Puede provocar implantes (placas pequeñas), nódulos (placas grandes) y endometriomas (quistes en los ovarios).

Síntomas

Causa un dolor intenso en la pelvis, sobre todo durante la menstruación. Algunas mujeres también sienten dolor durante las relaciones sexuales o cuando van al

Fertilidad

No siempre la endometriosis afecta a la fertilidad, por lo que la mujer puede quedar embarazada antes del tratamiento quirúrgico.

INFECCIONES CERVICOVAGINALES

¿Qué es?

En forma genérica, las infecciones vaginales pueden definirse clínicamente como una alteración de la ecología microbiológica vaginal que habitualmente resulta en uno o más de los siguientes síntomas y signos:

Flujo vaginal o leucorrea (término usado comúnmente)
Mal olor
Ardor
Prurito

Causas

Son causadas por agentes infecciosos y parasitarios en las que la transmisión sexual desempeña un papel importante, aunque en alguna de ellas no sea el mecanismo más relevante.

Factores


Inicio temprano de relaciones sexuales, conducta sexual promiscua, Diabetes Mellitus, embarazo, tratamientos hormonales, uso de DIU, ropa ajustada, duchas vaginales, embarazo, obesidad.

Prevención

Lavar el área vaginal con agua y jabón neutro.

Evitar el uso de ropa demasiado ajustadas y sintéticas (lycra o nylon), debido a que favorecen la humedad.

No utilizar duchas vaginales, aerosoles o toallitas higiénicas perfumadas.



CANCER CERVICOUTERINO

¿Qué es?

El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina.

Síntomas

Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre períodos o después de la menopausia

Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido

Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales

Causas

El cáncer cervical comienza cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan cambios (mutaciones) en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer.

CANCER DE ENDOMETRIO

¿Qué es?

El cáncer de endometrio se origina cuando células en el endometrio (revestimiento interno del útero) comienzan a crecer en forma descontrolada.

Tipos

Carcinoma de células escamosas

Carcinoma de células pequeñas

Carcinoma transicional

Carcinoma seroso

TUMORES DE OVARIOS

¿Qué es?

El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Las células de casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y propagarse.

Síntomas

Dolor o hinchazón del abdomen.
Dolor en la pelvis.
Problemas gastrointestinales, como gas, distensión abdominal o estreñimiento.

Causas

No está claro qué causa el cáncer de ovario, aunque los médicos han identificado factores que pueden aumentar el riesgo de padecer la enfermedad.

Los médicos saben que el cáncer de ovario comienza cuando las células en los ovarios o cerca de estos desarrollan cambios (mutaciones) en su ADN

Factores

- Edad avanzada
- Alteraciones genéticas hereditarias
- Antecedentes familiares de cáncer de ovario
- Sobrepeso u obesidad
- Endometriosis
- Edad avanzada

Prevención

- Considerada la posibilidad de tomar píldoras anticonceptivas
- Habla con el médico acerca de tus factores de riesgo