



Mi Universidad

SUPER NOTA

Nombre del alumno Daniela Yamile Domínguez Pérez

Nombre del tema Porcinos

Parcial 4

Nombre de la materia Patología y técnicas quirúrgicas en porcinos

Nombre del profesor Gonzalo Rodriguez Rodriguez

Nombre de la Licenciatura MVZ

Cuatrimestre 5



Parásitos en Cerdos



TRICHOSTRONGILOSIS

Causado por parásitos del género *Trichostrongylus*, estos se alojan en el estómago de los cerdos que causa gastritis hemorrágica provocando mala digestión y retardo del crecimiento.

SE INFECTAN AL INGERIR AGUA O ALIMENTO CONTAMINADO.

Algunos de los síntomas es diarrea, apetito variable, mucosas pálidas, desnutrición.

Tratamiento con ivermectina, el copro es vital.



Ascariasis del cerdo

Causado por *Ascaris suum* principalmente en animales jóvenes, las larvas causan daño en el hígado y en los pulmones, el parásito adulto se localiza en el intestino delgado.

SE INFECTAN AL INGERIR AGUA o TIERRA CON HECES CONTAMINADA.

Algunos de los síntomas es diarrea, secreciones nasales y tos, convulsiones, ictericia.

Tratamiento con albendazol.



Metastrongilosis

Por gusanos *Metastrongylus*, especialmente en cerdos criados en el exterior, causa neumonía en los cerdos y estos gusanos se encuentran en los bronquiolos y bronquios.

SE INFECTAN AL INGERIR TIERRA CON HECES CONTAMINADA.

Algunos de los síntomas es temblores, crecimiento lento, pérdida de peso y neumonía con tos.

Tratamiento con antihelmínticos.



Cisticercosis

Infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes larvarios de la tenia porcina, los quistes infectan el cerebro, los músculos y otros tejidos causando epilepsia.

SE INFECTAN POR CONTACTO DIRECTO VÍA FECAL-ORAL.

Algunos de los síntomas es diarrea, inapetencia, vómitos, adelgazamiento, parálisis y disnea.



Gusano del riñón

Infección causada por *Stephanurus Dentatus* que se aloja en los riñones, en la grasa a su alrededor, en los uréteres o tejidos cercanos.

Generalmente no se presentan síntomas.

Tratamiento con ivermectina, febantel.

