



## **S Ú P E R N O T A**

**NOMBRE DEL ALUMNO: MAKEYLA MARTÍNEZ LÓPEZ**

**NOMBRE DEL TEMA: PARASITOSIS PORCINAS**

**PARCIAL: NO. 4**

**NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGÍAS Y CIRUGÍAS EN PORCINOS**


**NOMBRE DEL PROFESOR: GONZALO RODRÍGUEZ**

**NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

**CUATRIMESTRE: NO. 5**

# PARASITOSIS

## EN PORCINOS



1)

### TRICHOSTRONGILOSIS

Este parásito se aloja en el estómago causando gastritis hemorrágica.

Sx: desgano, apetito variable, diarrea seguido de estreñimiento, mucosas pálidas.

Dx: Coprológico y cultivos.

Tx: Tiabendazol, Levamisol, Diclorvós, los Bencimidazoles y la Ivermectina.



### ÁSCARIS

Esta parasitosis se caracteriza por problemas digestivos, respiratorios y nerviosos, causada por *Áscaris summ.* Durante su migración las larvas destruyen los tejidos de los órganos por donde pasan y además causan reacciones inflamatorias considerables en estos sitios.

Sx: Peritonitis, neumonías, ictericia, tos, convulsiones e incoordinación

Dx: Coprológico, BH.

Tx: Piperazina, el Diclorvós, el Cambendazol, Febendazol, el Pirantel, el Levamisol y la Ivermectina



2)

### METASTRONGILOSIS


Parasitosis causada por varias especies de *Metastrongylus* siendo el más común *M. apri* el cual se aloja en la tráquea y en los bronquios pulmonares causándoles distintos grados de irritación e inflamación.

Sx: signos respiratorios como disnea, letargo, fiebre y secreciones nasales.

Dx: exudados nasales, coprológicos.

Tx: Levamisol, los Bencimidazoles, Oxfendazol, Albendazol y la Ivermectina.

Es necesario valorar la aplicación o no de antibióticos de amplio espectro en caso de complicaciones neumónicas. Vitamina A.



3)

### CISTECERCOSIS

causado por *Taenia solium*, localizados en el cerdo principalmente en la lengua, músculos maceteros, corazón músculos diafragmáticos y en otros tejidos.

Sx: Dificultad al caminar, quistes en el tórax, incoordinación, ataques epilépticos, dolor de cabeza, etc.

Dx: Rayos x, biopsia, pruebas serológicas.

Tx: Parazicuantel

4)

### ESTRONGILOSIS RENAL

El gusano del riñón es uno de los parásitos internos más comunes en cerdos especialmente en climas cálidos, causado por *Stephanurus dentatus*.

Sx: retardo de crecimiento, inflamación de piel, parálisis de patas traseras.

Dx: Resulta difícil en animales vivos buscar huevos en la orina. En animales muertos o sacrificados se observan los quistes descritos con los parásitos adultos en su interior.

Tx: Febantel por vía oral, el Febendazol, el Levamisol y la Ivermectina.



5)

## FUENTES DE CONSULTA

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/613ee79cc78391fcef9869d741f6b641-LC-LMV502-%20PATALOGIA%20Y%20TECNICAS%20QUIRURGICAS%20DE%20PORCINOS.pdf>