



**Nombre del alumno: Axel Josafat
Morales Juárez.**

**Nombre del trabajo: Enfermedades en
porcinos.**

**Materia: Técnicas quirúrgicas en
porcinos.**

Grado: Quinto

Grupo: A

CONTROL Y PREVENCIÓN

No existe tratamiento

DEFINICIÓN

Enfermedad causada por un paxivirus, el cual sobrevive bastante tiempo

TRATAMIENTO

Evitar que el animal se rasque o se lastime las papaulas.

VIRUELA PORCINA

CAUSAS

- Piojos
- Sarna
- Abrusiones cutáneas
- mezcla de cerdos

DIAGNOSTICO

Se eberan llevar acabo estudios clinicos para la confirmacion de esta enfermedad.

SINTOMAS

Se caracteriza por las vesiculas y costras, que se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo,

CONTROL Y PREVENCIÓN

Higiene en corrales y desparasitaciones, así como cuarentena de un nuevo animal.

DEFINICIÓN

Enfermedad parasitaria de la piel, causada por *Sarcoptes scabiei*.

TRATAMIENTO

Implementación de ivermectinas

SARNA PORCINA

CAUSAS

Presencia de ácaros, hacinamiento de animales, entrada de cerdos infectados, no separar por edades.

DIAGNÓSTICO

Raspados cutáneos de las lesiones en piel.

SINTOMAS

Prurito alergia intensa, piel enrojecida y problemas dermatológicos.

CAUSAS

- Mezcla de animales.
- Climas cálidos en verano con alta humedad.
- Sistemas de alimentación líquida, sobretodo si se usan productos derivados de la leche que pueden ser una fuente importante de infección puesto que el organismo se multiplica en ellos.

DEFINICION

El Mal Rojo o Erisipela Porcina es una enfermedad bacteriana producida por el *Erysipelothrix rhusiopathiae*

SINTOMAS EN CERDAS

- Muerte, infección generalizada.
- Fiebre alta.
- Pueden parecer normales.
- Abortos.
- Lechones momificados.

ERISPELA PORCINA

La bacteria invade el torrente sanguíneo por varias rutas incluyendo cortes en la piel o a través de la pared del tracto digestivo y se produce septicemia...

SINTOMAS EN VERRACOS

- Fiebre alta.
- Puede afectar al esperma durante todo el periodo de desarrollo de 5-6 semanas.

INCUBACION

El periodo de incubación es de 24- 48 horas. La enfermedad suele ser esporádica y es más frecuente en los meses cálidos (verano)