


Nombre del alumno: Filadelfo Domingo Ruiz Hernández.

Nombre del docente: Eduardo Roblero Tovar.

Nombre del trabajo: Mastitis y retención placentaria

Asignatura: Tecnicas quirurgicas en bovinos.

Grado y grupo: Quinto A



Retención placentaria

¿Qué es?

Se considera como un fallo en la expulsión de la placenta, dentro de 12 a 24 horas más tarde a la expulsión del feto, cuya causa es considerada multifactorial.

Se relaciona

La con la disminución en la actividad reproductiva de las hembras, como la continuación de días abiertos e intervalo entre partos.

Definición

La falla en la expulsión de las membranas fetales, comúnmente conocidas como placenta

Expulsión de la placenta

debe expulsarse varias horas después del parto y

se considera patológica o anormal cuando parte o la totalidad de la placenta permanece dentro del útero, por más de 12 horas después del parto (Horta, 1994)

Posibles causas

Deficiencia de vitaminas y minerales

Partos prematuros.

Partos distocicos

Abortos

Bibliografias

https://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/bovinos_leche/78-mastitis.pdf

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-79202016000200006

<https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/12927/Diego-Armando-Arrieta-Chac%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>