



Mi Universidad

SÚPERNOTA

NOMBRE DEL ALUMNO: MAKEYLA MARTÍNEZ LÓPEZ

NOMBRE DEL TEMA: ENFERMEDADES EN BOVINOS

PARCIAL: NO. 1

NOMBRE DE LA MATERIA: BOVINOS

NOMBRE DEL PROFESOR: EDUARDO ROBLERO TOVAR

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: NO. 5

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

En Bovinos

PASTEUROLOSIS

Conocido también como septicemia hemorrágica, provocado por la bacteria *Mannheimia haemolytica*, causado por estrés o una baja de inmunidad.

1.



El signo clínico más frecuente es el respiratorio o neumónico, moco fluido, disnea, pleuresía y la muerte puede presentarse a los 2 o 3 días.

se diagnóstica con biometría hemática y cultivo.


el tratamiento es paliativo y la prevención se realiza a través de vacunas.



TUBERCULOSIS

Caracterizada por la aparición de tubérculos en todos los órganos causada por *Mycobacterium bovis*, transmitida por contacto directo, salivación transmisión sexual, etc. ZOONOTICA.

2.



Los signos clínicos son fiebre baja, inapetencia, debilidad, tos húmeda que empeora durante la mañana disnea, taquipnea. Se diagnóstica únicamente por necropsia.

la prevención es mediante la vacunación.





HEAMOPHYLOSIS HISTAFILOSIS

Es la causa de la meningo encefalitis causado por *H. somus*.

3.



Los factores predisponentes son estrés, cambios de clima, parásitos, hacinamiento, etc. Las vías de transmisión son por estornudos, por I.A. contacto sexual, etc. Se han visto abortos causados por esta enfermedad. Las lesiones son: abortos, esterilidad, neumonía, infartos hemorrágicos. Puede tratarse con oxitetraciclinas.



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

En Bovinos

BEZOÁRIOS

Bola de material extraño que se acumulan en el estómago y no puede pasar del intestino. existen tres tipos: Fito bezoares, lacto bezoares y farmacobezoares.

4.



Las manifestaciones clínicas son: cólicos, inapetencia, acidosis, timpanismo, postración, esfuerzos para defecar, distensión abdominal. El diagnóstico es mediante BH, radiografías, ultrasonidos, ego. el tratamiento se basa en laxantes, analgésicos y ruminuotomía.

5.

COCCIDIOSIS

protozoo del género Eimeria Bovis y si oerne conocida también como diarrea roja, hemorrágica o disentería.



Los signos son destrucción del epitelio, diarrea hemorrágica, ruptura de vasos sanguíneos, deshidratación, anorexia, prolapso rectal. transmitido por contacto directo. su diagnóstico es mediante copros, y el tratamiento se basa en metronidazol, albenfazol, sulfas, solución fisiológica.

FUENTES DE CONSULTA

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/068c70f43a00491ad17acfe928760d4f-LC-LMV503-%20%20PATOLOGIA%20Y%20TECNICAS%20QUIRURGICAS%20DE%20BOVINOS.pdf>