



Nombre de alumno: FILADELFO
DOMINGO RUÍZ HERNÁNDEZ

Nombre del profesor: samhanta guillen

Nombre del trabajo: super nota

Materia: INTRODUCCION A LA CIRUGIA,
PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE
PEQUEÑAS ES PECIES

Grado: 5

Grupo: LMVZ

Comitán de Domínguez Chiapas a 3 de diciembre de 2021

GIARDIAS Y LOS COCCIDIOS



Las giardias y los coccidios son pequeños parásitos que infectan la mucosa intestinal del perro. Estos parásitos son relativamente comunes y pueden producir diarrea en perros de corta edad.

SIGNOS

La mayoría de las lombrices raras veces se distinguen en los excrementos y sus huevos no se aprecian a simple vista. Entre los síntomas de los parásitos intestinales se cuentan vómitos, diarrea, dolor abdominal, pelaje seco e inerte, tos, adelgazamiento o malestar general



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se lleva a cabo mediante un análisis de heces. Los excrementos se recogen en tres ocasiones y se envían al laboratorio para su examen.



TRATAMIENTO

La desparasitación. El medicamento antiparasitario se elige en función del tipo de parásito que tiene el perro. Los cachorros deben someterse a una desparasitación frecuente.



TOXOCARA CATI



La infección por nematodos o toxocariasis es la infestación de personas o animales con parásitos áscaris que se encuentran en el tracto intestinal de perros y gatos.

SIGNOS

fiebre, fatiga, tos, sibilancias, eosinofilia, hepatomegalia, dolor abdominal, anorexia y pérdida de peso.



DIAGNÓSTICO

se basa en los hallazgos de la evaluación clínica, los estudios epidemiológicos y las pruebas serológicas. Para la larva migratoria visceral (LMV), se recomienda el enzimoimmunoensayo



TRATAMIENTO

Se administra albendazol o mebendazol junto con corticoesteroides cuando los síntomas son graves, o en caso de infección ocular.

