



**Mi Universidad**

**Super Nota**

*Nombre del Alumno: Yaritza Hernández*

*Nombre del tema: endoparásitos ectoparásitos mas comunes en perros y en gatos*

*Parcial: 2*

*Nombre de la Materia: Patología y técnicas quirúrgicas de pequeñas especies*

*Nombre del profesor: Samantha Guillen*

*Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia*

*Cuatrimestre: 5*

# ENDOPARASITOS Y ECTOPARASITOS MAS COMUNES EN PERROS Y GATOS

## ECTOPARASITOS


### PULGAS

Son de color marrón, insectos sin alas, aplanadas lateralmente son poco específicas de hospedador. Las hembras ponen como mínimo 20 huevos por día.

Estas causan picor, anemia, alergia, alopecia, infección bacteriana. Pueden transmitir parásitos como el *Dipylidium Caninum* (endoparásitos).



### ÁCAROS



No son insectos pertenecen al grupo de los arácnidos algunos son inofensivos para la mayoría de los animales, otros patógenos son causantes de distintos tipos de sarnas y de otitis.



### GARRAPATAS



Se alimentan exclusivamente de sangre son vectores super eficientes, para transmisión de patógenos.

Las hembras ponen sus huevos en el medio ambiente y después muere.

Los huevos eclosionan y dan lugar a las larvas, las cuales se alimentan de 2 a 3 días del hospedador, para luego volver al medio externo para convertirse en ninfas son las que más tiempo pasan en el medio ambiente.



### PIOJOS



Insectos sin alas estos son hogareños y no les gusta cambiar de hospedador. Son super especializados: el piojo de perro no sobrevive en el gato o en el hombre.

Existen dos tipos de piojos el anoplura (chupador) y mallophaga (masticador).



## ENDOPARASITOS

### TOXACARA SP.

Estos son los parásitos intestinales más frecuentes (la toxacara canis, toxacara leonina). Se pueden infectar antes de nacer vía transplacentaria o por leche materna. En adultos se da a través de heces con huevos.

En casos más graves se muestra el animal con mal pelo, barriga de barril, delgado, y vómito con frecuencia incluso diarrea.



### ECHINOCOCUS

Causa una enfermedad del quiste hidatídico, este parásito mide 3 a 6 cm de longitud, habita en el intestino de los perros y otros caninos. Este quiste no tiene ninguna relación con los bultos o masas que puede aparecer en el perro.



### ANCYLOSTOMA

Gusano redondo su ciclo de vida es directo (sin hospedador intermedio) es capaz de penetrar la piel y la larva migra hacia los pulmones, tráquea y corazón; esto causa que el paciente tenga tos deglutida. Los adultos se fijan en la mucosa intestinal maduran sexualmente.

### DIPILYDIUM CANINUM

Se contagian por ingerir alguna pulga al acicalarse.

Esta contiene cisticercos del parásito que se desarrolla rápidamente en el intestino del animal, puede provocar diarrea incluso hace que salgan gusanos por el ano.



### DIROFILARIA SPP

Es un complejo patológico clínico, su agente etiológico es el nematodo sanguíneo dirofilaria immitis, afecta a caninos y otras especies, incluyendo al humano.

Se transmite por medio de los mosquitos uno de esos son el *ulex*, *anopheles*, etc.

