



Mi Universidad

Super nota

Nombre del alumno Daniela Yamile Domínguez Pérez

Nombre del tema Parásitos

Parcial 2

Nombre de la materia Patología y técnicas quirúrgicas de pequeñas especies

Nombre del profesor Samantha Guillen Pohlenz

Nombre de la Licenciatura MVZ

Cuatrimestre 5

Parasitos

HELMINTOS

NEMATODOS

Toxacara canis ZONOTICA

- Más común en cachorros durante la gestación.
- Gusano redondo (7-18 cm), color blanquecino cremoso.
- Huevos esféricos (75x90 micras), una sola gruesa y membrana gruesa.
- Después que el perro ingiere los huevos, eclosionan y las larvas penetran la pared intestinal.
- Su órgano predilecto es el INTESTINO DELGADO pero las larvas migratorias pueden hallarse en pulmones, ojos, corazón, hígado, etc.




Toxacara leonis NO ZONOTICA

- Perros que viven en la perrera tienen más probabilidades.
- Antiparasitarios correctos.
- Realizar análisis de heces.
- Limpieza en suelos y evitar la presencia de roedores.

SIGNOS CLINICOS

- Adelgazamiento
- Diarrea
- Abdomen retraído (viejos)
- Abdomen distendido (jóvenes)



Eucinarías *Ancylostoma duodenales*

Gusano redondo: macho (7-10 mm x 0.45 mm), hembra (9-15 mm x 0.6 mm) y huevos (40x60 µm).

Son blanquecinos con su extremidad anterior curvada hacia el dorso en forma de gancho.

- Los adultos se fijan en la mucosa intestinal.
- Su reservorio es en humanos, caninos, felinos, suelo, agua y vegetación.

Tienen la capacidad de penetrar la piel de 5-10 min.



Filarias (*Dirofilaria spp*)

Su agente etiológico es el *Dirofilaria immitis*, afecta a los caninos y otras especies, incluyendo al humano.

Lo transmite el mosquito (Culex, Anopheles y Aedes).



Dipylidium

Cestodo adulto (20-40 cm), de un color amarillento blanquecino a rojizo, apariencia de listón largo y plano.

Cada individuo presenta de 60 a 175 proglotidos aprox.

Su maduración a tenia adulta lleva unas 3-4 semanas.



Garrapatas

- Son vectores super EFICIENTES, para transmisión de patógenos, virus, protozoos, hematodos)

SE ALIMENTAN ÚNICAMENTE DE SANGRE.

Garrapata dura

- Ixodes
- Rhipicephalus
- Dermacentor

Garrapata blanda

- Argasidae



ECTOPARÁSITOS

Pulgas *Ctenocephalides felis/canis*

Insectos sin alas, aplanadas lateralmente y son hematófagos.

- Poco inespecíficas de hospedador.
- Diariamente ponen mínimo 20 huevos por día.
- Puede haber Dermatitis por picadura de pulga.

