



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno Cristian Sebastián Hernández Gordillo

Nombre del tema patología

Parcial 4

Nombre de la Materia patología en pequeñas especies

Nombre del profesor Samantha Guillen Pohlenz

Nombre de la Licenciatura mvz

Cuatrimestre 5

CAPRINOS

PEDICULOSIS

La phthiriasis, pediculosis o piojera ovina, es producida por la presencia y multiplicación de insectos del orden Phthiraptera sobre la piel de los animales y es padecida por el ganado lanar de todo el mundo, aunque raramente se la reconoce como una afección grave.



sintomas: Hay infestaciones leves que generalmente pasan inadvertidas, e rascan ocasionalmente o por las alteraciones en el vellón. En casos más avanzados, se ven por efecto del rascado, mechas de lana "quebradas", alopecias con escarificaciones irregulares y costras.

tratamiento: Ivermectina 3,15%: una sola aplicación.
Ivermectina 1%: dos aplicaciones con intervalo de 14 a 21 días.

LA FALSA GARRAPATA OVINA

La falsa garrapata ovina (*Melophagus ovinus*), es un parásito común de los ovinos, el cual realiza todo su ciclo de vida en el animal. La enfermedad producida se conoce como melofagiasis. El parásito se alimenta de sangre, produciéndose su transmisión por contacto directo entre animales.

sintomas: la disminución de producción de lana y al menor desarrollo del animal joven. El principal signo es que el animal se frota en los cercos, arboles, o en la manga y la aparición de lesiones inflamatorias y pruriginosas (produce picazón).

tratamiento: Ivermectina 3,15%: Una sola aplicación / Ivermectina 1%: 2 aplicaciones con intervalo de 14 días. 2 baños con intervalo de 14 días. 2 aplicaciones con intervalos de 14 días. *Los tratamientos por aspersión ("jetter") deben aplicarse en ovinos esquilados o con lana corta.



OESTRUS OVIS

Oestrus ovis L. (Diptera: Oestridae) constituye un importante agente productor de miasis en diversos ambientes de explotación de ovinos y caprinos. A pesar de la distribución cosmopolita del agente, el primer informe de su presencia en Cuba data de 1995, El gusano o mosca de la nariz ocasiona una enfermedad parasitaria llamada Oestrosis ovina o Miasis de la nariz, la cual es originada por larvas de la mosca *Oestrus ovis*

sintomas: afectan las cavidades nasales de ovinos y caprinos. Se caracteriza por la presencia de secreción nasal abundante, estornudos y respiración difícil.

tratamiento: Rafoxanide en dosis de 7.5 mg/kg administrado por vía oral. Closantel a 7.5 mg/kg. Nitroxinilo de 15-20 mg/kg. Ivermectina a razón de 0.2 mg/kg.

