



Mi Universidad

S Ú P E R N O T A

NOMBRE DEL ALUMNO: MAKEYLA MARTÍNEZ LÓPEZ

NOMBRE DEL TEMA: ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN CONEJOS

PARCIAL: NO. 4

NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGÍAS Y CIRUGÍAS EN AVES Y CONEJOS


NOMBRE DEL PROFESOR: GONZALO RODRÍGUEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: NO. 5



Enfermedades del CONEJO



Rinitis Infecciosa

Conocido también como coriza infecciosa. Es una infección respiratoria de las fosas nasales, sus causas se deben a la gran cantidad de gérmenes según las circunstancias ambientales.

Sx: estornudos, expulsión de gases, prurito nasal, mucosidades.

Dx: exudados nasales, cultivos, etc.

Tx: Cloranfenicol, gentamicina, eritromicina, inhalaciones nasales.



Dermatofitosis

También conocido como tiñas, causada principalmente por *Trichophyton mentagrophytes*, se transmite por contacto directo y es una enfermedad muy contagiosa.

Sx: Prurito, alopecia focal, con eritema, costras y escaras alrededor de los ojos, la nariz y las orejas.

Dx: raspados, cultivo, etc.

Tx: fungicidas, yodo, sulfato de cal, etc.

Sarna

Conocida también como sarna de la oreja p sarna auricular, es causada por el parásito o ácaro *Psoroptes Cuniculi*. Se da por contacto directo, causando una otitis al tener contacto con el pabellón auricular.

Sx: sacudidas de cabeza, prurito, inflamación, temperatura de la oreja elevada...

Dx: por medio de las lesiones provocadas por el ácaro y para observarlo es necesaria una lupa.

Tx: acaricidas como bromomrtil, azuntol, azufre, rotenona.



Papilomatosis

Causado por el virus Papiloma de Shope y es una enfermedad rara, se caracteriza por la apariencia de un tumor de características de un papiloma.


Sx: focos cutáneos rojos y elevados se convierten en crecimientos verrugosos de las orejas y los párpados.

Dx: biopsias.

Tx: intervención quirúrgica si este es benigno.

Canibalismo

Se presenta cuando la hembra mata a sus crías y se los come. las causas mas comunes son: deficiencia alimenticia, falta de agua, manejo inadecuado, nerviosismo en la coneja. Aunque el canibalismo no es precisamente sostenible para la mayoría de las especies, algunas de ellas adoptan ocasionalmente un comportamiento canibal.



Absceso Dentario

Se trata del sobrecrecimiento dental de los conejos, Esta enfermedad afecta a los incisivos, a los molares y a los premolares.

Sx: Dejan de comer heno, dificultad para comer, produce dolor al masticar.

Dx: Los incisivos inferiores tienden a crecer hacia fuera, y los incisivos superiores hacia dentro, mediante ojo clínico.

Tx: Limado de dientes cada 4 u 8 semanas.

¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA ZONOSIS EN LA PRODUCCIÓN?

- En caso de presentarse una zoonosis la producción deberá ser exterminada, y reemplazada por una nueva.
- Cada animal nuevo debe tener cuarentena para prevenir nuevas zoonosis.
- Los personal que intervienen deberán estar en las mejores condiciones de higiene y con protección adecuada para evitar el contagio.
- Tomar medidas preventivas ante la situación.
- realizar un reporte epidemiológico.

- No tener contacto con los animales contagiados sin protección adecuada.
- No entrar a otras producciones sin antes haber pasado por intervención higiénica, pues así se diseminará la enfermedad.
- No dejar ni un animal de la producción contagiada, aunque no muestren signos, algunos suelen ser portadores asintomáticos.

Fuentes de consulta

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/40a0789ca8dab026bbb1157b899dc791-LC-LMV506-PATOLOGIA%20Y%20TECNICAS%20QUIRURGICAS%20DE%20AVE S%20Y%20CONEJOS.pdf>