



Mi Universidad

Super Nota

Nombre del Alumno: Yaritza Hernández

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Patología y técnicas quirúrgicas de Aves y conejos

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: 5

ENFERMEDADES CONEJOS

RINITIS INFECCIOSA

Síntomas:

El primer síntoma son estornudos frecuentes. Luego se puede desarrollar un prurito nasal; los conejos frotan la nariz contra objetos o con las extremidades anteriores. Luego puede aparecer una secreción nasal y conjuntivitis con lagrimeo. La nariz y las extremidades anteriores se ensucian con exudados. Por obstrucción en las vías respiratorias se pueden producir ruidos. En algunos casos muy graves puede haber casos de bronquitis, pleuritis y neumonía.

Se conoce como:

La coriza es una de las enfermedades más frecuentes en explotaciones comerciales de conejos.



DERMATOFITOSIS


Síntomas:

Los síntomas de la tiña o dermatofitosis en conejos son:

- Calvas localizadas, ya que provoca alopecia
- Piel seca y descamada
- Lesiones en la piel que se van extendiendo cada vez más y que tienen color rojizo
- Picor y otras molestias
- El conejo se rasca constantemente, por lo que corre el riesgo de hacerse heridas e infecciones secundarias

Se conoce como:

Se denomina tiña o dermatomicosis una afección fitoparasitaria de la piel que afecta a los conejos de todas las edades y de forma particular a los gazapos.




SARNA

Síntomas:

Las heridas aparecen primero en los labios y la nariz, más tarde alrededor de la cabeza, el cuello, y alrededor de los genitales. Los ácaros de la sarna de madriguera harán que el conejo se rasque de manera compulsiva.

Se le conoce como:

Sarna Psoróptica Auricular (Otocariasis) La Otocariasis, sarna de la oreja o sarna auricular es una enfermedad parasitaria, significativa por las lesiones que causa al interior de la oreja



PAPILOMATOSIS.

Incidencia: La incidencia de la enfermedad es rara en conejos de laboratorio. Esta enfermedad se observa con mayor frecuencia en conejos de cola de algodón del Medio Oeste con brotes en conejos domésticos.

Se le conoce como:

: El virus del papiloma de Shope es un virus de ADN y un miembro del grupo de los papovavirus.




TRANSMISIÓN: SE HA DEMOSTRADO LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE ARTRÓPODOS MORDEDORES DE LA ENFERMEDAD NATURAL.

CANIBALISMO

El canibalismo en los conejos, es la anomalía que se presenta cuando la coneja mata a sus crías y se las come; en muchos casos sucede inmediatamente después del parto.

Las causas más frecuentes del canibalismo en los conejos son las siguientes:

- Falta de agua.
- Deficiencias en la alimentación.
- Manejo inadecuado.
- Nerviosismo en la coneja.
- Cruzamientos con sanguíneos



SI SE PRESENTA EL CANIBALISMO Y SE ANALIZA QUE DE LAS CAUSAS MENCIONADAS NO SON EL MOTIVO Y EL FENÓMENO VUELVE A APARECER HAY QUE ELIMINAR A LA CONEJA MADRE, EN EL CASO DE QUE SEA UN CASO AISLADO


ABSCESO DENTARIO Y MALOCCLUSIÓN DENTAL

Una de las enfermedades más comunes en los conejos es el sobrecrecimiento dental. Esta enfermedad afecta a los incisivos, a los molares y a los premolares.

Ofrecer a tu mascota una correcta alimentación a base de heno y realizar chequeos rutinarios en casa para comprobar el estado de los dientes de tu conejo es muy importante

Causas

Una de las principales causas es una alimentación incorrecta. Las dietas ricas en fibra favorecen el desgaste durante la masticación por su efecto abrasivo sobre los dientes.



SI LA CAUSA ES GENÉTICA, SU MASCOTA NO TENDRÁ MÁS REMEDIO QUE SER INTERVENIDA POR UN VETERINARIO EN UNA OPERACIÓN PARA IGUALAR LA LONGITUD DE LA MANDÍBULA Y DEL MAXILAR.

YARITZA HERNANDEZ