



Es un carnivoro felido dé la subfamilia de los panterinos y genero panthera. Su distribución actual se encuentra desde el extremo del sur de estados unidos, america central y america del sur.



Habitat


Esta especie habitaba desde Estados Unidos hasta el norte de Argentina, no obstante, a causa del exterminio de su especie por culpa del hombre, hoy en día solo forma parte de las selvas tropicales de América Central y del Sur.



Características del jaguar

Los jaguares poseen un color de ojos amarillento y unas orejas muy pequeñas y redondeadas. Estos animales son excelentes nadadores, por lo que siempre buscan instalarse en zonas cercanas al agua. Su peso es muy variado, por lo que podemos encontrar ejemplares desde 56 kg hasta 96 kg y, en casos menos comunes, incluso existen registros de machos que han llegado a pesar 160 kg. Su larga cola puede llegar a medir de 45cm a 75 cm.





Alimentación del jaguar

Estos carnívoros tienen en su dieta más de 85 especies para alimentarse y su forma de caza es completamente letal. Puede escalar, arrastrarse y nadar, por lo que difícilmente una presa se le escapa. A su vez, sus dientes son tan potentes. son capaces de atravesar pieles gruesas y rugosas de reptiles y perforar sin problema caparazones de tortugas. De igual manera, puede arrastrar hasta ocho metros animales muy pesados y convertir sus huesos en polvo

Reproducción del jaguar



se comunican previamente a la copulación por medio de las vocalizaciones. De este modo, cuando la hembra está en celo, emite sonidos que son respondidos por los machos. Estos suelen competir para determinar al ganador. Después de la cópula, la hembra no tolera la presencia de los machos.

alcanzan la madurez sexual entre los 12 y 24 meses y el macho entre los 24 y 36 meses. La duración del ciclo estral es de 7 días, con 6 a 17 días de período de celo. Durante ese tiempo, las hembras transpiran un olor más fuerte que llama la atención de otros jaguares.Los nacimientos se dan comúnmente en estaciones húmedas, debido a la gran abundancia de presas. Nacen de una a tres crías tras un período de gestación que va desde los 91 hasta los 111 días