

NOMBRE DEL ALUMNO: SYLVIA MILETH GUTIERREZ CITALAN

TEMA :MAPA SINÓPTICO UNIDAD 3

MATERIA:NUTRICIÓN EN LA INFANCIA

NOMBRE DEL PROFESOR: JULIBETH MARTINEZ GUILLEN

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

QUINTO CUATRIMESTRE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS. 10 DE MARZO DEL 2023

TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA

Trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso.

TIPOS

ANOREXIA NERVIOSA

- síndrome psiquiátrico multifactorial, que se manifiesta por la pérdida de peso voluntaria

BULIMIA NERVIOSA

- Realizar ingestas masivas de alimentos, pretenden controlar su peso provocándose el vómito o utilizando laxantes o diuréticos.

TRASTORNO POR ATRACÓN

- Caracterizado por "atracones", como los que se observan en la bulimia, pero que no van seguidos de vómitos ni otras medidas para contener el apetito.

CELIAQUÍA

¿QUE ES?

Forma crónica de enteropatía de mecanismo inmunológico que afecta el intestino delgado de niños y adultos es precipitada por la ingestión de alimentos que contienen gluten.

CATEGORÍAS

Dependiendo de la vía de exposición a los alérgenos y los mecanismos inmunológicos de base.

RECOMENDACIONES

GLUTEN

Masa proteica gomosa que queda luego de lavar la masa de trigo para eliminar el almidón.

PRINCIPALES COMPONENTES

Los principales componentes de la proteína de gluten- gliadina y glutenina - son proteínas de almacenamiento presentes en el trigo.

- Alergia alimentaria clásica dependiente de los alimentos que afecta la piel, el tracto gastrointestinal o las vías respiratorias.
 - Anafilaxia inducida por el ejercicio
 - Rinitis y asma ocupacional (asma del panadero)
 - Urticaria de contacto
-
- Dieta sin gluten

DIABETES INFANTIL

¿QUE ES?

La diabetes es un padecimiento que cada año aumenta en número de pacientes y no distingue edad, sexo o condición socioeconómica y cada año se presentan más casos en niños y jóvenes debido al sobrepeso u obesidad.

TIPOS

PCI

- **DM1:** El px deja de producir insulina, hormona responsable de mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Es el tipo de diabetes más común en edad pediátrica, pero se puede presentar también en adultos jóvenes
- **DM II :** Se asocia frecuentemente a px con obesidad o sobrepeso. Por esta condición, el problema es que hay resistencia al efecto de la insulina.
- **Aparálisis cerebral** se refiere a cualquiera de un número de trastornos neurológicos que aparecen en la infancia o en la niñez temprana y que afectan permanentemente el movimiento del cuerpo y la coordinación de los músculos pero que no evolucionan, en otras palabras, no empeoran con el tiempo.

ALIMENTACION VEGETARIANA

INICIO

La alimentación vegetariana en la infancia cumplirá con las expectativas de las familias que desean que sus hijos, incluso desde las primeras etapas de vida, adoptan dietas vegetarianas y estilos de vida veganos, porque esta misma familia lo es

RIESGOS

Una alimentación completamente basada en plantas desde las primeras etapas de vida y mal ejecutada puede representar un gran riesgo de enfermedades a corto, mediano y largo plazo,

UTIL

En los familiares que deciden iniciar en el camino de la dieta basada en plantas, debido a cuestiones sociales, culturales o por patologías presentes que impiden la ingesta de alimentos de origen animal.

- Anemia ferropénica y megaloblástica, desarrollo en el desarrollo psicomotor y neurológico, desnutrición y bajo peso

BIBLIOGRAFIA

- *Universidad del sureste 2020. Nutrición en la infancia y adolescencia
Unidad 3 Recuperado el 10 de marzo 2023. <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LNU/d53e94b5c0ed9b616ba0fa90169cdf73-LC-LNU504%20NUTRICI%C3%93N%20EN%20LA%20INFANCIA%20Y%20ADOLESCENCIA.pdf>*