



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Vázquez Gómez Zayra
Yamilet

Nombre del tema: Super Nota

Parcial: Cuarto

Nombre de la Materia: Enfermería Clínica
II

Nombre del profesor: Sandra Jazmín Ruiz
Flores

Nombre de la licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Quinto

INICIE LA RCP

- Administre oxígeno
- Conecte el monitor/desfibrilador

¿El ritmo es desfibrilable?

FV/TV sin pulso

Descarga

2 min de RCP
-Obtenga acceso IV/IO

¿El ritmo es desfibrilable?

No

Si

2 min de RCP
-Administre adrenalina cada 3 a 5 min
-Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y capnografía.

¿El ritmo es desfibrilable?

Si

2 min de RCP
-Administre amiodarona o lidocaína
-Trate las causas reversibles

Asistólica/AESP

Adrenalina lo antes posible

2 min de RCP
-Obtenga acceso IV/IO
-Administre adrenalina cada 3 a 5 min.
-considerar la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado para la vía aérea y capnografía .

¿El ritmo es desfibrilable?

Si

No

2 min de RCP
-Trate las causas reversibles

¿El ritmo es desfibrilable?

Si

No

-Si no existen signos de retorno de la circulación espontanea (RCE).
Vaya al punto 10 u 11
-si existe RCE. Ir a Cuidados posparo cardiaco.
-Considere si es apropiado continuar con la reanimación .

Vaya al punto 5 o 7