

TRATAMIENTO

- Los benzodicepinas son el medicamento de primera elección en el tratamiento inicial de la CC en fase ictal.
- Tanto el lorazepam como el diazepam (por vía intravenosa) son igualmente de eficaces para el control de la CC.
- Tanto el diazepam rectal como el midazolam (vía intramuscular o intranasal) son efectivos en controlar las CC.

PRONOSTICO DE VIDA

- En términos generales el pronóstico de la epilepsia es bueno.
- Se han realizado varios estudios que han investigado la probabilidad de que una persona con epilepsia permanezca sin ninguna crisis durante al menos dos años mientras toma el tratamiento.
- Estos estudios muestran que esta probabilidad se encuentra en torno al 80-90%, tanto para niños como para adultos.



NOMBRE DEL ALUMNO: YESSICA DE LA CRUZ GÓMEZ BERNAL

NOMBRE DEL TEMA: EPILEPSIA

PARCIAL: 4

NOMBRE DE LA MATERIA: FISIOPATOLOGIA II

NOMBRE DEL PROFESOR: JAIME HELERIA CERON

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERÍA CUATRIMESTRE: 5

PICHUCALCO, CHIAPAS 29/ 03/23


BIBLIOGRAFIA:

Epilepsia, la “enfermedad sagrada”, diario
Página|12. Consultado el 2 de febrero de 2011.

«Epilepsia en perros». Vet Mex 39 (3): 279-321.
2008. Archivado desde el original el 9 de
diciembre de 2011. Consultado el 4 de marzo de
2010.

Sociedad Española de Neurología. «Día
nacional de la Epilepsia». Consultado el 23 de
julio de 2009.

EPILEPSIA



DEFINICION

- es un trastorno crónico no transmisible del cerebro, que afecta a personas de todas las edades en todo el mundo, y se caracteriza por convulsiones recurrentes no provocada

FACTORES DE RIESGO

- Antecedentes familiares de trastornos convulsivos.
- Una lesión en el cerebro producto de un traumatismo, un accidente cerebrovascular, una infección previa y otras causas.
- Privación del sueño.
- Problemas médicos que afectan el equilibrio de electrolitos.
- Uso de drogas ilegales.
- Consumo excesivo de alcohol.

ETIOLOGIA

- en PD corresponde frecuentemente a malformaciones del desarrollo cortical, patología cerebrovascular y a tumores cerebrales, mientras que en México y en la mayoría de países de AL está asociada con traumatismos craneoencefálicos, infecciones del sistema nervioso central, complicaciones prenatales y perinatales e infestaciones parasitarias por Neurocisticercosis, muchas de ellas causas prevenibles, y resultado de la pobreza y de la falta de educación

CUADRO CLINICO

- confusión temporal
- episodios de ausencias
- perdida en conocimiento o conciencia
- síntomas psíquicos
- Movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas.
- Pérdida del conocimiento o la consciencia.
- Síntomas psicológicos, como miedo, ansiedad

PREVENCION

- Prevenga lesiones cerebrales traumáticas
- Reduzca las probabilidades de tener accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiacas
- Vacúnese
- Lávese las manos y prepare los alimentos de manera segura
- Manténgase sana durante el embarazo

DIAGNOSTICO

- Electro Encéfalo Grama (EEG)
- DIAGNOSTICO
- Tomografía Computada, Resonancia Magnética

EPIDEMIOLOGIA

población rural de Tecamatlán, niños de 12 años.

25 y 41 por 1,000 habitantes

70 escuelas primarias de una población urbana (Tlalpan) en niños de 9 años

42.2 por 1,000 habitantes

Comunidad rural de San Andrés Azumiatla mediante encuestas a domicilio

CLASIFICACION

- origen focal
- origen motor
- origen no motor
- generalizado
- motor
- no motor
- desconocido
- motor
- no motor