



Nombre del Alumno José Miguel Reyes Villegas

Nombre del tema labio leporino y paladar hendido

Parcial 4

Nombre de la Materia patología del niño y del adolescente

Nombre del profesor Cecilia de la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura enfermería

Cuatrimestre 5

Lugar y Fecha: 30 de marzo del 2023, Pichucalco , Chiapas

LABIO LEPORINO y PALADAR HENDIDO

Concepto

El labio leporino y la hendidura del paladar se producen cuando las estructuras faciales de un feto no se cierran por completo.

El labio leporino y la hendidura del paladar son algunos de los defectos congénitos más frecuentes. Ocurren con mayor frecuencia como defectos congénitos aislados, pero también se asocian con muchos síndromes o trastornos genéticos hereditarios.

Etiología


El labio leporino y la hendidura del paladar suceden cuando los tejidos de la cara y de la boca del bebé no se fusionan de manera adecuada. Normalmente, se unen en el tercer mes del embarazo. Pero en ellos la fusión nunca ocurre, o bien es parcial, dejando una abertura (hendidura).

Signos y síntomas

- Una separación en el labio y en la parte superior de la boca que afecta uno o ambos lados del rostro.
- Una separación en el labio que puede presentarse solo como una pequeña hendidura o que puede extenderse desde el labio a través de la encía superior y del paladar hasta la parte inferior de la nariz.
- Una separación en la parte superior de la boca que no afecta la apariencia del rostro.

Diagnostico

- Pueden diagnosticarse durante el embarazo mediante una ecografía de rutina.
- También pueden diagnosticarse después de que nazca el bebé, especialmente el paladar hendido.



Complicaciones

- Dificultad para alimentarse
- Infecciones del oído y pérdida de la audición
- Problemas en los dientes
- Dificultades con el habla
- Desafíos de enfrentar una enfermedad

Prevención

Mientras que muchos casos de labio leporino y hendidura del paladar no pueden prevenirse, ten en cuenta estas medidas para aumentar tu conocimiento o disminuir los riesgos:


- Considera buscar asesoramiento en genética
- Toma vitaminas prenatales
- No consumas tabaco o alcohol.

Tratamiento

- La cirugía para corregir el labio hendido generalmente se realiza en los primeros meses de vida y se recomienda que se haga dentro de los primeros 12 meses.
- Queiloplastia: Reconstrucción del labio en los 2/3 meses de vida.
- Palatoplastia: Reconstrucción de paladar. 6/12 meses de vida.

Cuidados de enfermería

- Terapia de deglución
- Ayuda en la lactancia materna.
- Apoyo en la toma de decisiones.
- Educación paterna del niño.
- Restablecimiento de la salud bucal
- Control de infecciones (6540)
- Protección contra las infecciones



Clasificación

Tipos de labios leporinos

- Labio hendido completo
- Labio hendido incompleto
- Labio hendido cicatricial
- Labio hendido bilateral

Tipos de paladar hendido

- Tipo I: hendidura del paladar blando
- Tipo II: hendidura del paladar blando y duro que comprometen solo en paladar secundario
- Tipo III: hendidura completa unilateral
- Tipo IV: hendidura completa bilateral

Labio leporino



Labio normal



LL Unilateral Incompleta



LL Unilateral Completo



LL Bilateral

Paladar Hendido



Paladar normal



FP Incompleta



FP Unilateral Completa



FP Bilateral

Bibliografía

- <https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/birthdefects/cleftlip.html#:~:text=un%20beb%C3%A9%20sano.-,Diagn%C3%B3stico,beb%C3%A9%2C%20especialmente%20el%20paladar%20hendido.>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cleft-palate/symptoms-causes/syc-20370985>
- <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/plan-de-cuidados-de-enfermeria-en-un-bebe-recien-nacido-con-labio-leporino/>