



Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno: Yessica de la Cruz Gómez Bernal

Nombre del tema: Tipos de parásito

Parcial : 2ro

Nombre de la Materia : Patología del niño y del adolescente

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Quinto Cuatrimestre

Parasitos intestinales

Del tipo Protozoo

Blastocistiasis



se contagia por :

- Agua o alimentos contaminados
- Exposición a heces humanas o animale

- Diarrea líquida
- Náuseas
- Dolor abdominal
- Pérdida del apetito
- Pérdida de peso
- fatiga

Complicaciones:

La diarrea y el vomito al no ser controladas propicia una perdida de liquidos y minirales lo cual puede llevar a un caso de deshidratacion.


factores de riesgo

- Trabajar con animales
- Estar expuesto a heces humanas
- Viajar a un país con saneamiento del agua deficiente

prevencion

- Lava las frutas y los vegetales.
- Mantén limpias las superficies .
- Lávate las manos con frecuencia

Giardiasis



se contagia por :

La infección se produce cuando ingieres por accidente los quistes del parásito.

- Diarrea líquida
- Fatiga
- Cólicos
- Náuseas
- Pérdida de peso

Complicaciones:

- Deshidratación
- Retraso en el desarrollo
- Intolerancia a la lactosa.

factores de riesgo

- beber agua no segura,
- a través del contacto de persona a persona.
- Personas que tienen sexo anal.

prevencion

- Lávate las manos
- Purifica el agua de las áreas silvestres.
- Lava los productos.
- elaciones sexuales seguras

Amibiasis



se contagia por :

- A través del agua
- suelo con desechos humanos
- contacto con una persona infectada

- Diarrea con sangre
- Fatiga
- Flatulencia excesiva
- Dolor rectal Pérdida de peso involuntaria

Complicaciones:

- Absceso hepático
- Diseminación del parásito a través de la sangre

factores de riesgo

- Alcoholismo
- Cáncer
- Desnutrición
- Embarazo
- región tropical

prevencion

- bebe agua potable
- No coma verduras crudas ni frutas sin pelar.
- Lave sus manos .

Parasitos intestinales

Del tipo Helminto

Tricocefalosis



se contagia por :

- carnes mal cocinadas
- verdura cruda contaminada.

- diarrea
- dolor abdominal,
- malnutrición
- malestar general
- debilidad

Complicaciones:
se pueden presentar desnutrición, anemia, desplazamiento del parasito a otro lugar del organismo

factores de riesgo

- La falta de acceso agua
- pobres condiciones higiénicas y de vivienda.

prevencion

- refrigerar los alimentos .
- cocinar bien las carnes
- lavar bien las frutas y verduras

Ascariasis



se contagia por :

- consumir alimentos o bebidas que están contaminados con huevos de áscaris.

- Tos, sibilancias
- Fiebre baja
- Expulsión de lombrices
- Dolor de estómago

Complicaciones:
• Obstrucción de los conductos biliares
• Bloqueo en el intestino
• Orificio en el intestino

factores de riesgo

- beber agua no segura
- alimentos mal cocinados

prevencion

- Bebe agua potable
- No coma verduras crudas
- Lave sus manos

Teniasis



se contagia por :

- Ingestión de huevos
- Ingestión de los quistes de larvas en la carne

- Náuseas
- Debilidad
- Pérdida de apetito
- Dolor abdominal
- Diarrea

Complicaciones:
• Masas o bultos quísticos
• Reacciones alérgicas
• síntomas neurológicos, incluidas convulsiones

factores de riesgo

- Higiene deficiente.
- Exposición al ganado
- Comer carne cruda o poco cocida.

prevencion

- Lávate las manos
- Cocina bien la carne
- Trata rápidamente a los perros infectados con tenia

Murray, P. R. (2021). *Microbiología Médica, 9ª Ed.* (9.^a ed.). Elsevier España, S.L.U.

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/pinworm/symptoms-causes/syc-20376382>