



**Mi Universidad**

*Nombre del Alumno: Yubitza Ascencio Galera.*

*Nombre del tema: paladar hendido y labio leporino.*

*Parcial: 4.*

*Nombre de la Materia: patología del niño y del adolescente*

*Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez.*

*Nombre de la Licenciatura: enfermería.*

*Cuatrimestre: 5°.*

# Paladar hendido y labio leporino.

## ¿Qué es?

- El paladar hendido y el labio leporino son defectos congénitos. Ocurre cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente.
- **El labio leporino** es la separación del labio superior, habitualmente justo por debajo de la nariz.
  - **El paladar hendido** es una abertura en la parte superior de la boca (paladar) que da lugar a un paso anómalo hacia la nariz.



## Clasificación

- **Labio leporino unilateral:** un corte en un lado del labio.
- **Labio leporino bilateral:** cortes a ambos lados del labio.
- **Paladar hendido completo:** que va desde detrás de los dientes delanteros hasta la parte posterior del paladar.
- **Paladar hendido incompleto:** que afecta únicamente la parte posterior del paladar, cerca de la parte posterior de la garganta.
- **Paladar hendido incompleto y un labio leporino unilateral incompleto:** el bebé tiene una hendidura a un lado del labio únicamente y esta no se extiende hacia las fosas nasales. Además, tiene una hendidura en la parte superior de la boca (paladar) que no se extiende hasta la parte posterior del paladar.
- **Paladar hendido completo con un labio leporino completo bilateral:** el bebé tiene hendiduras en ambos lados del labio y estas llegan hasta las fosas nasales. Además, tiene una hendidura en la parte superior de la boca, que se extiende hasta la parte posterior.



## Síntomas

- Dificultad con la alimentación.
- Dificultad para tragar, con la posibilidad de que los líquidos o los alimentos salgan por la nariz.
- Voz nasal al hablar.
- Infecciones de oídos crónicas.



# Paladar hendido y labio leporino.

## Causas

- Los genes.
- Síndrome genético.
- La salud y el medio ambiente



## Diagnostico

El labio leporino se puede diagnosticar en el embarazo durante una ecografía de rutina. Por lo general, se puede ver durante el primer examen del bebé, aunque algunos tipos de paladares hendidos no se pueden ver de manera fácil y quizás no se diagnostiquen hasta más adelante.



## Tratamiento

Tanto el labio leporino como el paladar hendido pueden corregirse con cirugía.

- La primera cirugía para el labio leporino suele hacerse antes de que el bebé tenga 1 año de edad, pero tan pronto como sea posible.
- La primera cirugía para el paladar hendido suele hacerse antes de que el bebé tenga 18 meses de edad, pero, en este caso también, tan pronto como sea posible.



## Complicaciones

- Problemas para comer.
- Infecciones de oído y pérdida de la audición.
- Retraso en el habla y uso del lenguaje.
- Problemas dentales.



<https://kidshealth.org/es/parents/orofacial-clefts.html#:~:text=Paladar%20hendido>

<https://medlineplus.gov/spanish/cleftlipandpalate.html>

<https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/salud-infantil/defectos-cong%C3%A9nitos-de-la-cara,-los-huesos,-las-articulaciones-y-los-m%C3%BAsculos/labio-leporino-y-paladar-hendido>