



NOMBRE DEL ALUMNO:

YESSICA DE LA CRUZ GOMEZ BERNAL

NOMBRE DEL TEMA: LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO

PARCIAL: 4

NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGÍA DEL NIÑO

NOMBRE DEL PROFESOR: CECILIA DE LA CRUZ SÁNCHEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE:5

1 DE ABRIL DEL 2023 A; PICHUCALCO CHIAPAS

Paladar Hendido y Labio Leporino

CONCEPTO

El labio leporino y el paladar hendido ocurren cuando el bebé nace con una hendidura en el labio superior y/o en el paladar. Estas fisuras o hendiduras orofaciales se encuentran entre las anomalías o malformaciones congénitas más frecuentes.

EPIDEMIOLOGIA

La hendidura del labio y la del paladar con frecuencia se producen a la vez. Son los defectos congénitos más frecuentes del cráneo y de la cara y afectan aproximadamente a 2 de cada 1000 bebés.

DIAGNOSTICO

Un bebé con labio leporino o paladar hendido debe ser evaluado por un genetista. Un genetista es un médico especializado en genética (la ciencia de los genes y cómo ciertas cualidades o rasgos se transmiten de los padres a la descendencia). Se pueden realizar pruebas genéticas de una muestra de sangre del bebé para detectar anomalías cromosómicas y genéticas. Estas pruebas pueden ayudar a los médicos a determinar si la causa es un trastorno genético específico y descartar otras causas.

SINTOMAS

El labio leporino es desfigurante e impide que el bebé cierre los labios cuando succiona el pezón. El paladar hendido afecta la alimentación y el habla y aumenta el riesgo de infecciones del oído.

TRATAMIENTO

Las hendiduras labiales y palatinas se corrigen mediante una intervención quirúrgica. El momento adecuado para la cirugía depende de la deformidad y del lactante. Para un paladar hendido, a menudo se realiza un procedimiento quirúrgico en dos etapas. El labio leporino, la nariz y el paladar blando (la parte blanda y lisa de la parte posterior del paladar) se reparan entre los 3 y los 6 meses de edad. Luego, el paladar duro (la parte frontal dura del surco del paladar) se repara entre los 15 y los 18 meses de edad.

CLASIFICACION

En esta malformación congénita se ven alteradas varias estructuras como el labio, el proceso alveolar, el paladar duro y el paladar blando. Aparte de eso se debe considerar que puede presentarse de manera aislada, combinada, unilateral o bilateral.

CUIDADOS DE ENFERMERIA

La enfermera juega un papel fundamental en los cuidados y la alimentación de este tipo de pacientes. Asesora, aconseja, guía, enseña, apoya y acompaña durante todo el proceso a los padres del niño/a con labio Leporino. Además de ser el personal de referencia para sus familiares.

Bibliografía

<https://medlineplus.gov/spanish/cleftlipandpalate.html>

<https://www.msmanuals.com/es-mx/hogar/saludinfantil/defectos-cong%C3%A9nitos-de-la-cara,-los-huesos,-las-articulaciones-y-los-m%C3%BAsculos/labio-leporino-y-paladar-hendido>

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseasesconditions/cleft-palate/symptoms-causes/syc-20370985>