



Mi Universidad

Nombre del Alumno

Diana patricia castillejos López

Nombre del tema

Paladar hendido y labio leporino

Parcial

Cuarto parcial

Nombre de la Materia

Patología del niño y el adolescente

Nombre del profesor

Cecilia de la cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura

Lic. Enfermería

Cuatrimestre

Quinto cuatrimestre

Paladar hendido
Y labio leporino

¿Qué es?

Un **labio leporino** y/o paladar hendido es una **afección congénita** en la cual partes de la cara de un bebé no se fusionaron correctamente durante el desarrollo en el útero, y como resultado, el niño nace con una hendidura o espacio en el labio superior (labio leporino) y/o en la parte superior de la boca (paladar hendido).

Síntomas

El síntoma principal de un labio leporino es la **aparición física** de la cara del bebé. Puede afectar solo un lado del labio, o puede haber dos fisuras separadas. Las hendiduras pueden ser pequeñas muescas o pueden extenderse hasta la nariz.

Un paladar hendido, por otro lado, es un agujero en la parte superior de la boca y puede ser menos obvio que un labio leporino. Los paladares hendidos a veces pueden quedar ocultos por el revestimiento del propio paladar. Una vez más, pueden variar en tamaño, desde un pequeño agujero en la parte posterior de la boca hasta una hendidura que recorre todo el paladar de la boca hasta el labio

causas

Los labios leporinos y los paladares hendidos pueden causar diferentes problemas hasta que se arreglan con cirugía:

- Alimentación: el bebé puede tener dificultades con la **lactancia materna** o con el biberón, ya que su boca no puede formar un sello.
- Problemas dentales: los dientes del niño pueden no desarrollarse correctamente y puede tener un riesgo superior al promedio de caries dental.
- Problemas de habla: si el labio leporino y el paladar hendido no se arreglan con la cirugía, pueden afectar al habla cuando el niño es mayor.
- Problemas auditivos: algunos bebés con labio leporino o paladar hendido tienen un mayor riesgo de infecciones de oído y oído pegajoso (acumulación de líquido en el oído), lo que puede afectar la audición.

Diagnostico

Un labio leporino o paladar hendido se puede diagnosticar antes del nacimiento si aparece en una **ecografía**. La mayoría se detectan durante la exploración de anomalías a mitad del embarazo (por lo general, se realiza entre las semanas 18 y 21 del embarazo). Sin embargo, algunas veces la afección no será obvia en la **gammagrafía** y es posible que no se note hasta que nazca el bebé.

¿Que lo provoca?

No se sabe exactamente por qué sucede esto, pero se cree que ciertos genes pueden predisponer a un bebé a un labio leporino o a un paladar hendido; estos genes son desencadenados por un factor ambiental. En unos pocos casos se ha relacionado con los siguientes factores de riesgo:

- La madre fuma o bebe durante el embarazo, exponiendo al feto al tabaco y al alcohol.
- Ser obeso durante el embarazo.
- Insuficiente consumo de ácido fólico durante el embarazo.
- Tomar ciertos medicamentos al comienzo del embarazo.

Tratamiento

La solución principal para un labio leporino y/o paladar hendido es la **cirugía** para volver a unir el tejido y cerrar la hendidura. La **cirugía para cerrar un labio leporino** generalmente se realiza cuando el bebé tiene entre tres y seis meses, mientras que la cirugía para cerrar un paladar hendido un poco más tarde, generalmente entre seis y doce meses

Bibliografía

[Labio leporino: qué es, síntomas y tratamiento | Top Doctors](#)