



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno FRANCISCO AGUSTIN CANTORAL ALVAREZ

Nombre del tema PALADAR HENDIDO Y LABIO LEPORINO

4TO Parcial


Nombre de la Materia PATOLOGIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Nombre del profesor CECILIA DE LA CRUZ SANCHEZ

Nombre de la Licenciatura ENFERMERIA

5TO Cuatrimestre

Pichucalco, Chiapas; 31 de marzo del 2023



Labio leporino y paladar hendido

LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO

El labio leporino y la hendidura del paladar son orificios o hendiduras en el labio superior, en el techo de la boca (paladar) o en ambas partes. El labio leporino y la hendidura del paladar se producen cuando las estructuras faciales de un feto no se cierran por completo.



LABIO LEPORINO

LABIO LEPORINO UNILATERAL
un corte en un lado del labio

LABIO LEPORINO BILATERAL
cortes a ambos lados del labio



Bebé con paladar hendido



Paladar hendido

PALADAR HENDIDO

PALADAR HENDIDO COMPLETO
Va desde detrás de los dientes delanteros hasta la parte posterior del paladar.

PALADAR HENDIDO INCOMPLETO
Afecta únicamente la parte posterior del paladar, cerca de la parte posterior de la garganta.

SINTOMAS

Por lo general, una separación (hendidura) en el labio o en el paladar se identifica de inmediato al momento del nacimiento. El labio leporino y paladar hendido pueden manifestarse de la siguiente manera:

- Una separación en el labio y en la parte superior de la boca que afecta uno o ambos lados del rostro.
- Una separación en el labio que puede presentarse solo como una pequeña hendidura o que puede extenderse desde el labio a través de la encía superior y del paladar hasta la parte inferior de la nariz.
- Una separación en la parte superior de la boca que no afecta la apariencia del rostro.

CAUSAS

El labio leporino y la hendidura del paladar suceden cuando los tejidos de la cara y de la boca del bebé no se fusionan de manera adecuada. Normalmente, los tejidos que conforman el labio y el paladar se fusionan entre sí durante el segundo y el tercer mes del embarazo. Pero en los bebés con labio leporino y hendidura del paladar, la fusión nunca ocurre, o bien es parcial, dejando una abertura (hendidura).

FACTORES DE RIESGO

- Antecedentes familiares.
- La exposición a determinadas sustancias durante el embarazo.
- Tener diabetes.
- Tener obesidad durante el embarazo.

TRATAMIENTO

- Cirujanos especializados como cirujanos plásticos u otorrinolaringólogos.
- Cirujanos orales
- Especialistas en oído, nariz y garganta (ORL, también llamados otorrinolaringólogos)
- Pediatras
- Dentistas pediátricos
- Ortodoncista

Bibliografía

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cleft-palate/diagnosis-treatment/drc-20370990>

<https://kidshealth.org/es/parents/orofacial-clefts.html#:~:text=Paladar%20hendido,-El%20paladar%20hendido&text=Puede%20ser%3A,parte%20posterior%20de%20la%20garganta>

<https://medlineplus.gov/spanish/cleftlipandpalate.html>