



NOMBRE DEL ALUMNO: FERNANDAPARIBANU JIMÉNEZ GARCÍA

NOMBRE DEL TEMA: EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO

PARCIAL: 2

NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

NOMBRE DEL PROFESOR: MARIANOWALBERTO BALCÁZAR VELASCO

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 5

17 DE FEBRERO DEL 2023 A; PICHUCALCO CHIAPAS

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO SANO.

CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO

- Dormir entre 18 a 22 horas al día
- Baño diario
- Los bebés suelen comer cada 3 horas (leche materna)

- Acueste siempre a su hijo boca arriba o de lado y en un colchón firme
- Evite abrigar en exceso a su bebé

CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO

- Las variaciones que van desde 2.800 kg a los 3.900 kg
- Evaluar el peso y la talla
- Administración de vitamina "A"

- Vitamina K, 1 mg intramuscular
- Profilaxis oftálmica. Dos gotas de antibiótico
- Inmunizaciones: BCG y la vacuna contra hepatitis B

CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO

- Tamiz auditivo
- Tamiz de cardiopatía crítica.
- Bilirrubina transcutánea.
- Tamizado metabólico

- Tamizado oftalmológico
- Detección de atresia de vías biliares.
- Valoración de Apgar
- Valoración de Silverman-Andersen

1. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON

PRESENCIA DE MECONIO.

SI EL BEBÉ NO ESTÁ ACTIVO Y LLORANDO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PARTO:

- Calentará y mantendrá temperatura normal del cuerpo

- Secará y estimulará al bebé

SI EL BEBÉ NO ESTÁ RESPIRANDO O TIENE UNA BAJA FRECUENCIA CARDÍACA:


- Le ayudará a respirar utilizando una mascarilla que va conectada a una bolsa que suministra una mezcla de oxígeno para inflar los pulmones del bebé.

- Se puede colocar al bebé en una sala de cuidados especiales para bebés o en la unidad de cuidados intensivos neonatales para una observación cuidadosa.

CUIDADOS

- Óxido Nítrico
- Surfactante para ayudar a los pulmones a intercambiar oxígeno: solo se usa en los casos más severos.

- Antibióticos para tratar posibles infecciones.
- Oxígeno para mantener los niveles sanguíneos normales.
- Alimentación intravenosa





REANIMACIÓN NEONATAL

VENTILACIÓN CON PRESION POSITIVA

Frecuencia: 40 - 60 x'.
 Ritmo y tiempo inspiratorio:
 "Ventila, dos, tres... Ventila, dos, tres..."
 Presión: 20 - 25 cm H2O (tres dedos).
 1 ciclo = 30 segundos.

PASOS CORRECTIVOS

Máscara: ajústela.
 Reposicionar vía aérea.
 Succión en boca y nariz.
 O: boca abierta.
 Presión: aumentela.
 Alterne la vía aérea.

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL

Hoja RECTA de laringoscopio:
 N° 1: RNT.
 N° 0: RNPT.
 N° 00: RNPT extremos.


¿Cuánto introducir el tubo endotraqueal?
 Distancia del tabique nasal
 al trago de la oreja + 1 cm.

| Peso (kg) | DI de tubo endotraqueal (mm) | SDG |
|-----------|------------------------------|---------|
| < 1.0 | 2.5 | < 28 |
| 1.0 - 2.0 | 3.0 | 28 - 34 |
| > 2.0 | 3.5 | > 34 |

DETERIORO REPENTINO POST-INTUBACIÓN

D ... Tubo endotraqueal desplazado.
 O ... Tubo endotraqueal obstruido.
 P ... Neumotórax.
 E ... Falla del equipo.

Fuente: Reanimación Neonatal. 7a edición.
 American Heart Association /
 American Academy of Pediatrics.



Bibliografía

- https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912014000600010
- https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/ninios/guianinos_reciennacido.pdf
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001596.htm#:~:text=E%20meconio%20tambi%C3%A9n%20puede%20bloquear,del%20beb%C3%A9%20despu%C3%A9s%20del%20nacimiento.>
- <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/632GRR.pdf>
- Reanimación Neonatal Reanimación Neonatal (Perlman JM, 2010)