



Nombre del Alumno: Yubitza Ascencio Galera.

Nombre del tema: maniobras de Leopold.

Parcial: 2°.

Nombre de la Materia: ginecología y obstetricia.

Nombre del profesor: Victor Manuel Nery González.

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 5°.




Lugar y Fecha de elaboración: Pichucalco, Chiapas; a 15 de febrero del 2023.

Maniobras de Leopold.

¿Qué son?

Técnicas de palpación que se emplean para examinar el abdomen de la embarazada y así mismo determinar la presentación, situación y posición del feto. Se debe realizar a partir de la semana 20 a 22 de gestación, pero se obtendrán mejores resultados si se hacen específicamente a las 32 sdg.



1ra maniobra.

Evalúa la altura del fondo uterino. Identifica que polo fetal se encuentra ocupando el fondo uterino, puede ser el polo cefálico o el polo pélvico. Se realiza ubicado a la derecha y frente al paciente se palpa con ambas manos el abdomen superior, se utilizan las 3 R. la cabeza fetal suele palpase como una masa Redonda, Regular y Resistente.



2da maniobra.

Evalúa la posición fetal. Posición del feto (izquierda o derecha) y la situación (longitudinal o transversa) fetal, "define de que lado materno (derecho o izquierdo) se encuentra el dorso del producto. El examinador debe encontrarse siempre frente a la paciente. Una de las manos debe ejercer una presión constante mientras la mano contraria palpa el lado contrario del abdomen. Para la palpación se utilizan las palmas de las manos y se debe aplicar una presión profunda pero gentil.



**3ra
maniobra.**

Evalúa la presentación fetal. Identificar la altura de la presentación (libre, abocado y encajado) y corroborar la presentación. El examinador debe colocarse frente a la paciente, utilizando el pulgar y dedos de una sola mano se realiza una palpación en garra por encima de la sínfisis del pubis.



**4ta
maniobra.**

Grado de encajamiento. Identificar la presentación y corroborar la altura de la presentación (libre, abocado y encajado) "define que tipo de presentación se aboca al estrecho superior de la pelvis". Para realizar la maniobra primero debe ubicarse la sínfisis del pubis y encima de esta comenzar a palpar. La palpación se realiza con los pulpejos de los dedos de ambas manos y desde el borde inferior del útero hasta la sínfisis del pubis.

